

制酸薬

日本薬局方

医薬品

炭酸水素ナトリウム

(重曹)

Sodium Bicarbonate

【使用上の注意】



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 腎臓病の診断を受けた人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師に相談すること

2週間位服用しても症状がよくなる場合

【効能効果】

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、もたれ、胃重、胸つかえ、げっぷ、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、飲みすぎ、胃痛

【用法用量】

大人（15歳以上）1回 $\frac{1}{3}$ 包を1日3回食前又は食間に服用する。

〈用法用量に関連する注意〉

用法用量を厳守すること。

【成分分量】

1包（1日量）中

日局炭酸水素ナトリウム 3g含有

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。
- (5) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

【包装】

3g×12包