

ノンエタノール・ウイルスなどの
アルコール抵抗性ウイルスにも
効果的な手指消毒剤です！



弱酸性

速乾性すり込み式手指消毒剤

ラビショット[®]A

RABISHOT[®]A

弱酸性

速乾性すり込み式手指消毒剤

ラビジェル[®]A

RABIGEL[®]A

感染の予防や伝播の防止に新たな対策を！



速乾性すり込み式手指消毒剤 指定医薬部外品

ラビショットA[®]

RABISHOT[®] A



速乾性すり込み式手指消毒剤 指定医薬部外品

ラビジェルA[®]

RABIGEL[®] A

インフルエンザウイルス、ノロウイルス感染症等、わが国で毎年流行する感染症の起因ウイルスや、MRSA、グラム陰性桿菌等の感染症起因菌による感染を防止するため、確実な手指消毒はきわめて重要であり、日常の手指消毒剤として各種速乾性すり込み式手指消毒剤が使用されています。

しかし、速乾性すり込み式手指消毒剤の主成分であるエタノールは、一部のノンエンベロープウイルスに対して効果が得られにくいことが報告されています。これらのウイルスによる感染の予防や伝播の防止に向けて、より効果的な手指衛生を実践すべく、新たな手指消毒剤が求められてきてています。

ラビショットA・ラビジェルAは、有効成分としてエタノールを76.9～81.4vol%含有し、添加物としてリン酸を配合することで、ノンエンベロープウイルスを含む広範囲な微生物に効果を有した速乾性すり込み式手指消毒剤です。ラビショットAは液状、ラビジェルAは低粘性ゲル状の弱酸性の製剤です。

特性

1.

有効成分
エタノール

+

添加物
リン酸

有効成分エタノールに、添加物としてリン酸を配合した弱酸性の速乾性すり込み式手指消毒剤であり、ウイルス（ノンエンベロープウイルス・エンベロープウイルス）・一般細菌・真菌等、広範囲な微生物に対して迅速な作用が期待できます¹⁾。

2.

湿潤剤としてグリセリンやアラントイン、ミリスチン酸イソプロピルを含有し、手荒れ防止に配慮しています¹⁾。

3.

速乾性のすり込み式手指消毒剤なので、流水やタオルの必要がありません。

4.

ラビジェルAは適度な粘性をもつゲルタイプなので、液の飛散やこぼれ落ちがありません。

組成性状

	ラビショットA	ラビジェルA
有効成分	エタノール (C ₂ H ₆ O)	76.9～81.4vol%
添加物	リン酸、グリセリン、アラントイン、ミリスチン酸イソプロピル、グリセリン脂肪酸エステル、パラオキシ安息香酸エチル、N-ヤシ油脂肪酸アシル-L-アルギニンエチル・DL-ピロリドンカルボン酸塩	リン酸、グリセリン、アラントイン、ミリスチン酸イソプロピル、グリセリン脂肪酸エステル、パラオキシ安息香酸エチル、N-ヤシ油脂肪酸アシル-L-アルギニンエチル・DL-ピロリドンカルボン酸塩、ヒドロキシプロピルセルロース
性状	無色透明の液です。	無色透明の粘性の液です。

ウイルス不活化効果 (*in vitro*試験)

ラビショットA・ラビジェルAの*in vitro*におけるウイルス不活化効果について、日局消毒用エタノールを対照として評価しました。その結果、ラビショットA・ラビジェルAはいずれの供試ウイルスに対しても15秒以内で不活化し、特にノンエンベロープウイルスに対しては、日局消毒用エタノールに比べてより短時間で不活化できることが確認されました¹⁾。

ウイルス	ウイルス不活化時間*			
	ラビショットA	ラビジェルA	日局消毒用エタノール	
ノンエンベロープ ウイルス	ネコカリシウイルス(ノロウイルス代替ウイルス)	≤15秒間	≤15秒間	>1分間
	マウスノロウイルス(ノロウイルス代替ウイルス)	≤15秒間	≤15秒間	≤15秒間
	口タウイルスA型	≤15秒間	≤15秒間	≤15秒間
	ポリオウイルス2型	≤15秒間	≤15秒間	1分間
	コクサッキーウィルスA10型	≤15秒間	≤15秒間	30秒間
	アデノウイルス2型	≤15秒間	≤15秒間	≤15秒間
エンベロープ ウイルス	A型インフルエンザウイルス(H1N1)pdm09	≤15秒間	≤15秒間	≤15秒間
	A型インフルエンザウイルス(H3N2)	≤15秒間	≤15秒間	≤15秒間
	単純ヘルペスウイルス1型	≤15秒間	≤15秒間	≤15秒間

* : 99.9%以上の不活化に要した時間

● 健栄製薬株式会社 社内資料：ラビショットA・ラビジェルA 各種試験成績

殺菌効果 [ASTM E2315-03 (Time-Kill試験)] (*in vitro*試験)

ラビショットA・ラビジェルAの*in vitro*における殺菌効果について試験した結果、いずれの供試菌に対しても15秒以内で殺菌できることが確認されました¹⁾。

菌種	殺菌時間*	
	ラビショットA	ラビジェルA
グラム陽性菌	Enterococcus faecalis ATCC 29212	≤15秒間
	Vancomycin-resistant Enterococcus faecalis ATCC 51299	≤15秒間
	Staphylococcus aureus NBRC 12732	≤15秒間
	Methicillin-resistant Staphylococcus aureus ATCC 33591	≤15秒間
	Staphylococcus epidermidis ATCC 12228	≤15秒間
	Streptococcus pyogenes ATCC 12351	≤15秒間
	Mycobacterium terrae ATCC 15755	≤15秒間
	Mycobacterium avium RIMD 1312004	≤15秒間
グラム陰性菌	Acinetobacter baumannii ATCC 19606	≤15秒間
	Burkholderia cepacia NBRC 15124	≤15秒間
	Escherichia coli NBRC 3806	≤15秒間
	Klebsiella pneumoniae ATCC 10031	≤15秒間
	Proteus mirabilis NBRC 3849	≤15秒間
	Proteus vulgaris NBRC 3988	≤15秒間
	Pseudomonas aeruginosa NBRC 13275	≤15秒間
	Multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa GTC 02017	≤15秒間
	Serratia marcescens NBRC 12648	≤15秒間
真菌	Candida albicans NBRC 1594	≤15秒間

* : 99.999%以上の減少に要した時間

● 健栄製薬株式会社 社内資料：ラビショットA・ラビジェルA 各種試験成績

皮膚に対する影響 -ビデオマイクロスコープによる皮膚状態の観察-

ラビショットA・ラビジェルAを前腕内側部（直径3.5cmの円状）に1回約0.6mL用いて1日6回、14日間連続塗布した場合の皮膚状態について、無塗布部位を対照として評価しました。その結果、ラビショットA・ラビジェルA塗布部位は14日間連続塗布後も無塗布部位とほとんど差異は認められませんでした¹⁾。

ラビショットA・ラビジェルAの14日間塗布後の皮膚画像
(ビデオマイクロスコープ100倍)



● 健栄製薬株式会社 社内資料：ラビショットA・ラビジェルA 各種試験成績

ラビショット[®]A・ラビジェル[®]A の INFORMATION

商品名	和名	ラビショット [®] A									
	洋名	RABISHOT [®] A									
販売名	手指消毒用アルコールV1		手指消毒用ジェルV1								
製造販売元	健栄製薬株式会社										
分類	速乾性すり込み式手指消毒剤										
区分	指定医薬部外品										
承認番号	22500DZX01419		22500DZX01421								
承認年月	2013年11月										
販売開始年月	2013年12月										
組成性状	有効成分	エタノール (C ₂ H ₆ O) 76.9 ~ 81.4vol%									
	添加物	リン酸、グリセリン、アラントイン、ミリスチン酸イソプロピル、グリセリン脂肪酸エステル、パラオキシ安息香酸エチル、N-ヤシ油脂肪酸アシル-L-アルギニンエチル・DL-ピロリドンカルボン酸塩									
	性状	無色透明の液です。									
効能効果	手指・皮膚の洗浄・消毒		手指・皮膚の洗浄・消毒								
	適量を手指にとり、塗布又は塗擦してください。		適量を手指にとり、塗布又は塗擦してください。								
用法用量	<p>〈用法用量に関連する注意〉</p> <p>(1)用法用量を厳守してください。</p> <p>(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。</p> <p>(3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合は、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。</p> <p>(4)外用にのみ使用してください。</p> <p>(5)血液や汚物等が付着している場合には、石けんでよく洗浄後、使用してください。</p> <p>(6)使用後は手を十分に乾燥させてください。(乾燥不十分のまま火気に手を近づけると引火するおそれがあります。)</p>		<p>〈用法用量に関連する注意〉</p> <p>(1)用法用量を厳守してください。</p> <p>(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。</p> <p>(3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合は、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。</p> <p>(4)外用にのみ使用してください。</p> <p>(5)血液や汚物等が付着している場合には、石けんでよく洗浄後、使用してください。</p> <p>(6)使用後は手を十分に乾燥させてください。(乾燥不十分のまま火気に手を近づけると引火するおそれがあります。)</p>								
使用上の注意	<p>してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります) 次の人には使用しないでください (1)患部が広範囲の人。 (2)深い傷やひどいやけどの人。</p> <p>相談すること</p> <p>1.次的人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください (1)医師の治療を受けている人。 (2)本人又は家族がアレルギー体質の人。 (3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> <p>2.次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談してください 使用後、次の症状があらわれた場合</p> <table border="1"> <tr> <th>関係部位</th> <th>症状</th> </tr> <tr> <td>皮ふ</td> <td>発疹・発赤、かゆみ</td> </tr> </table>		関係部位	症状	皮ふ	発疹・発赤、かゆみ	<p>してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります) 次の人には使用しないでください (1)患部が広範囲の人。 (2)深い傷やひどいやけどの人。</p> <p>相談すること</p> <p>1.次的人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください (1)医師の治療を受けている人。 (2)本人又は家族がアレルギー体質の人。 (3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> <p>2.次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談してください 使用後、次の症状があらわれた場合</p> <table border="1"> <tr> <th>関係部位</th> <th>症状</th> </tr> <tr> <td>皮ふ</td> <td>発疹・発赤、かゆみ</td> </tr> </table>	関係部位	症状	皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
関係部位	症状										
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ										
関係部位	症状										
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ										
保管及び取扱い上の注意	<p>〈貯法〉気密容器・火気を避けて室温保存 〈使用期限〉容器等に表示</p> <p>(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。 (2)小児の手の届かない所に保管してください。 (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。) (4)火気に近づけないでください。 (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。 (6)開封時、容器の肩部又は底部をもち、液がとびださないように、キャップを開けてください。 (7)薬剤が床、家具、革製品、大理石や一部の宝石等に付着しないようにしてください。(変質又は変色のおそれがあります。)</p>		<p>〈貯法〉気密容器・火気を避けて室温保存 〈使用期限〉容器等に表示</p> <p>(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。 (2)小児の手の届かない所に保管してください。 (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。) (4)火気に近づけないでください。 (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。 (6)薬剤が床、家具、革製品、大理石や一部の宝石等に付着しないようにしてください。(変質又は変色のおそれがあります。)</p>								
包裝	500mL、1000mL		500mL								

[詳細は製品容器等をご参照ください。]

参考文献

1) 健栄製薬株式会社 社内資料 : ラビショットA・ラビジェルA 各種試験成績

資料請求・お問い合わせ先

健栄製薬株式会社 学術情報部
 〒541-0044 大阪市中央区伏見町2丁目5番8号 電話番号 06(6231)5626 FAX番号 06(6204)0750