

50

※※ 2008年6月改訂 (第3版)

※ 2001年9月改訂

日本標準商品分類番号 872615

※承認番号 (13AM)566

※薬価収載 2001年9月

販売開始 1976年9月

再評価結果 1983年4月

飲用不可

50

外用殺菌消毒剤

ケンエー消毒用
イソプロピルアルコール50

火気注意 *飲用不可*

50w/w%

500mL

貯法：気密容器

火気避けて

室温保存

注意：「取扱い上の注意」
の項参照

健栄製薬株式会社

大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5626

ケンエー消毒用イソプロピルアルコール・50

【禁忌 (次の部位には使用しないこと)】

損傷皮膚及び粘膜 [損傷皮膚及び粘膜への使用により、刺激作用を有する。]

【組成・性状】

イソプロパノール (C₃H₈O) 50w/w% (換算
57.7vol%) を含有する。

無色透明の液で、特異なおいがある。

※※【効能・効果】

手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒

【用法・用量】

本品をそのまま用いる。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

(1) 眼に入らないように注意すること。

眼に入った場合には水でよく洗い流すこと。

(2) 広範囲又は長期間使用する場合には、蒸気の
吸入に注意すること。

2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明
確となる調査を実施していない。(1) 過敏症：発疹等の過敏症状 (頻度不明) があ
らわれることがあるので、このような場合に
は使用を中止し、適切な処置を行うこと。(2) 皮膚：刺激症状 (頻度不明) があらわれる
ことがあるので、このような症状があらわれ
た場合には使用を中止すること。

3. 臨床検査結果に及ぼす影響

注射部位に発赤を起こすことがあるので、ア
レルギーテストの判断を妨害することがある。

4. 適用上の注意

(1) 人体

1) 投与経路：外用にのみ使用すること。

2) 使用時：同一部位 (皮膚面) に反復使用し
た場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こ
すことがあるので、注意すること。

(2) その他

使用時：血清、膿汁等の蛋白質を凝固させ、
内部にまで浸透しないことがあるので、これ
らが付着している医療器具等に用いる場合に
は、十分に洗い落してから使用すること。

【取扱い上の注意】

〈注意〉

引火性、爆発性があるため、火気 (電気メス使
用等も含む) には十分注意すること。

キャップ：PP

ボトル：PE

外装フィルム：PP


ケンエー消毒用
イソプロピルアルコール50つぶして廃棄
しやすい
減容ボトル製造
番号
使用
期限

〈調剤包装単位用コード〉



0111111101111

〈販売包装単位用コード〉



0111111101111