

ジエン<sup>®</sup>液2% 第2類医薬品

2%

〔成分量〕次亜塩素酸ナトリウム 2%

〔成分に関する注意〕

消毒する製品によっては印刷面、材質等を変色（変質）する場合があるので注意してください。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になります。品質が変わることがあります。）
- (4)衣類等につくと脱色、変色があるので注意してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

〔貯法〕

遮光した気密容器。室温保存。

〔哺乳びん・乳首の消毒方法〕

①哺乳びん・乳首を授乳後すぐにブラシと食器用洗剤で洗い、水でよくすいでください。

②哺乳びん・乳首を消毒溶液（本剤の160倍液）中に完全に沈め、次の授乳まで1時間以上浸漬させます。

消毒溶液は、24時間ごとに新しく調製してください。

③調乳の直前に哺乳びん・乳首を取り出し、消毒溶液をよく振りきって使用してください。

〔哺乳びん・乳首の浸漬〕



哺乳びん・乳首を、中に気泡が残らないように消毒溶液中に完全に沈め、次の授乳まで1時間以上浸漬させます。消毒溶液は、24時間ごとに新しく調製してください。

⑥登録商標

2%

哺乳びん・乳首・医療器具等消毒液 第2類医薬品

ジエン<sup>®</sup>液2%

次亜塩素酸ナトリウム 2 w/v% 液

JIAEN SOLUTION 2%

500mL

健栄製薬株式会社  
ケンエー  
大阪市中央区伏見町2丁目6番8号  
電話番号 06(6231)5626

⚠ 使用上の注意 (使用前に必ずお読みください)

相談すること

使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 脣	あれ、発疹・発赤、かゆみ



キャップ : PP  
パッキン : PE, PP  
ボトル : PE  
ラベル : PS

ジエン<sup>®</sup>液2% 第2類医薬品

2%

〔効能効果〕〔用法用量〕

効能効果	用法用量	濃度	消毒溶液1L調製時のジエン液2%の必要量
哺乳びん・乳首の消毒	哺乳びん・乳首を洗浄、水洗いした後、本剤の160倍液にて1時間以上浸してください。	0.0125%	6.25mL
医療器具の消毒	本剤の40～100倍液に数分間浸すか、清拭してください。	0.02～0.05%	10～25mL
器具・物品などの消毒	本剤の40～100倍液に数分間浸すか、清拭してください。	0.02～0.05%	10～25mL
室内・便所・浴室の消毒	本剤の40～100倍液で清拭してください。	0.02～0.05%	10～25mL
排泄物の消毒	本剤の2～20倍液を用いてください。	0.1～1%	50～500mL

〔用法用量に関する注意〕

- (1)用法用量を厳守してください。（熱湯での希釈は避けてください。）
- (2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。  
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3)酸性の洗浄・漂白剤、シアヌール酸系の製品等との混合は危険なので避けてください。
- (4)金属製の容器は、変質があることがあるので、用いてください。また、哺乳びん・バサミ・スプーン等の金属製品や指輪等を消毒溶液につけることも避けてください。
- (5)調製後、消毒溶液が変色した場合は、水質が本剤には不適当なので、その水での本剤の使用を避けてください。
- (6)化学繊維、皮革、毛、絹製品への使用を避けてください。
- (7)あやまって飲みこんだ場合は、すぐに水・生卵・ミルク等を飲み、医師に相談してください。

80%  
本  
見  
4 1987286314419

製造番号

使用期限