

※2009年7月改訂(第2版)

1999年11月作成

日本標準商品分類番号 872241

承認番号 (61AM)1224

薬価収載 1986年3月

販売開始 1986年3月

再評価結果 1981年8月

鎮咳去痰剤

劇

日本薬局方

キョウニン水

キョウニン水「ケンエー」

Apricot Kernel Water

500mL

※規制区分：劇薬

貯法：気密容器

遮光して室温保存



健栄製薬株式会社

大阪市中央区伏見町2丁目5番8号

電話番号 06(6231)5626

製造
番号
使用
期限

※【禁忌(次の患者には投与しないこと)】
ジスルフィラム、シアナミド、カルモフル、プロカルバジン塩酸塩を投与中の患者(「1.相互作用」の項参照)

【組成・性状】

〈組成〉

1 mL中 日局キョウニン水 1 mL含有。

〈性状〉

無色～微黄色澄明の液で、ベンズアルデヒド様のおい
及び特異な味がある。

【効能・効果】

急性気管支炎に伴う咳嗽及び喀痰咯出困難

【用法・用量】

キョウニン水として、通常成人1日3 mLを3～4回に分
割経口投与する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

但し、極量として、1回2 mL、1日6 mLをこえないも
のとする。

※【使用上の注意】

1.相互作用

(1)併用禁忌(併用しないこと)

薬剤名等	臨床症状・ 措置方法	機序・ 危険因子
※ ジスルフィラム ノックピン シアナミド シアナマイド カルモフル ミフロール プロカルバジン塩酸塩	これらの薬剤と のアルコール反 応(顔面潮紅、 血圧降下、悪心、 頻脈、めまい、 呼吸困難、視力 低下等)を起こ すおそれがある。	本剤はエタ ノールを含 有している ため。

(2)併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・ 措置方法	機序・ 危険因子
※ N-メチルテトラゾ ルチオメチル基を有す るセフェム系抗生物質 セフメノキシム塩酸 塩 セフォペラゾンナ トリウム セフペラゾンナ トリウム セフミノクスナ トリウム水和物 セフメタゾールナ トリウム ラタモキシフェナ トリウム メトロニダゾール	これらの薬剤と のアルコール反 応(顔面潮紅、 悪心、頻脈、多 汗、頭痛等)を 起こすおそれ がある。	本剤はエタ ノールを含 有している ため。

※2.副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる
調査を実施していない。

大量投与(頻度不明)：悪心・嘔吐、下痢、めまい、
頭痛、瞳孔散大、心悸亢進、過呼吸、チアノーゼ、意
識喪失、窒息性痙攣等の症状があらわれるおそれ
がある。

※3.高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量
するなど注意すること。

※4.小児等への投与

小児等への投与を避けること。[小児等では副作用が
発現しやすい。]

〈調剤包装単位用コード〉



0111111011111

〈販売包装単位用コード〉



0111111011111

ガラス：瓶



キャップ：PP
バックイン：PE,PP

日本薬局方

キョウニン水