

外皮用収れん・消炎・保護剤

日本薬局方

亜鉛華軟膏

亜鉛華軟膏〈ハチ〉

Zinc Oxide Ointment

500g

貯法：気密容器
室温保存

発売元

健栄製薬株式会社

大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5626

製造販売元

東洋製薬化成株式会社

大阪市鶴見区鶴見2丁目5番4号

〔禁忌(次の部位には使用しないこと)〕

重度又は広範囲の熱傷

※〔組成・性状〕

1g中 日局酸化亜鉛200mg含有。

添加物として流動パラフィン、サラシミツロウ、ソルビタンセスキオレイン酸エステル、白色ワセリン、ブチルヒドロキシアニソール、ジブチルヒドロキシトルエンを含有する。

白色である。

〔効能・効果〕

下記皮膚疾患の収れん・消炎・保護・緩和な防腐
外傷、熱傷、凍傷、湿疹・皮膚炎、肛門痒痒症、
白癬、面皰、瘡、よう

その他の皮膚疾患によるびらん・潰瘍・湿潤面

〔用法・用量〕通常、症状に応じ1日1～数回、
患部に塗擦又は貼布する。

〔使用上の注意〕

1. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

	頻度不明
過敏症 ^{注)}	過敏症状
皮膚 ^{注)}	発疹、刺激感等

注)このような場合には使用を中止すること。

2. 適用上の注意

投与経路：眼には使用しないこと。

〔薬効薬理〕

酸化亜鉛の収れん、消炎、保護、緩和な防腐並びに浸出液吸収性を持ち、更に皮膚軟化性及び皮膚密着性を有する。これらの作用により、痂皮を軟化し、肉芽形成・表皮形成を促進させて皮膚疾患を速やかに改善する。

承認番号(61AM)3148

薬価収載 1986年3月

販売開始 1988年11月

再評価結果 1979年2月

〈調剤包装単位用口〉



(01)04987286803616

〈販売包装単位用口〉



(01)14987286403615

製造番号

使用期限

キャップ：PP
カバーフィルム：PE
ボトル：PE
外装フィルム：PET