

鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤

日本薬局方

フェノール亜鉛華リニメント

フェノール・亜鉛華リニメント〈ハチ〉
(カチリ)Phenol and Zinc Oxide
Liniment

500g

貯法：気密容器
室温保存発売元
健栄製薬株式会社
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5626製造販売元
東洋製薬化成株式会社
大阪市鶴見区鶴見2丁目5番4号〔禁忌(次の部位には使用しないこと)〕
び爛・潰瘍・結痂・損傷皮膚及び粘膜

※〔組成・性状〕

100g中 液状フェノール2.2mL、酸化亜鉛10g含有。
添加物としてグリセリン、トラガント末、カルメロースナトリウムを含有する。
白色ののり状で、わずかにフェノールのおいがある。

〔効能・効果〕

皮膚瘙痒症、汗疹、じん麻疹、小児ストロフルス、虫さされ

〔用法・用量〕

通常1日1～数回適量を患部に塗布する。
なお、症状により適宜増減する。

〔使用上の注意〕

1. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

	頻度不明
過敏症 ^{注)}	過敏症状
皮膚 ^{注)}	発疹、刺激感等

注)このような場合には使用を中止すること。

2. 適用上の注意

- (1)投与経路：眼には使用しないこと。
(2)使用時：長期間又は広範囲に使用しないこと。

〔薬効薬理〕

フェノール(2%)の防腐、消毒、鎮痒作用と酸化亜鉛の収れん作用のほか、皮膚面に塗擦すると水分が蒸発してトラガントの薄膜が残り、皮膚を保護する作用を有する。

製造番号

使用期限

承認番号(61AM)3180
薬価収載 1986年3月
販売開始 1989年1月
再評価結果 1982年8月

〈調剤包装単位用コード〉



(01)04987286803623

〈販売包装単位用コード〉



(01)14987286403622

ガラス：瓶

キャップ：PP
中 栓：PE
外装フィルム：PET