

※【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1)本剤は、濃度に注意して使用すること。
- (2)炎症又は易刺激性の部位に使用する場合には、正常の部位に使用するよりも低濃度とすることが望ましい。
- (3)本剤を希釈して使用する場合は、調製後滅菌処理すること。

2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

過敏症：発疹、痒痒感等の過敏症状（頻度不明）があらわれることがあるので、このような場合には使用を中止し、適切な処置を行うこと。

3. 臨床検査結果に及ぼす影響

本剤で消毒したカテーテルで採取した尿は、スルホサリチル酸法による尿蛋白試験で偽陽性を示すことがある。

4. 適用上の注意

(1)人体

1)投与経路：経口投与しないこと。

2)使用時：

ア. 原液が眼に入らないように注意すること。

眼に入った場合には水でよく洗い流すこと。

イ. 皮膚・粘膜の刺激症状があらわれることがあるので、注意すること。

ウ. 粘膜、創傷面又は炎症部位に長期間又は広範囲に使用しないこと（全身吸収による筋脱力を起こすおそれがある）。

エ. 密封包帯、ギプス包帯、パックに使用すると刺激症状があらわれることがあるので、使用しないことが望ましい。

(2)その他

※1)調製方法：繊維、布（綿、ガーゼ、ウール、レーヨン等）は本剤の成分であるベンゼトニウム塩化物を吸着するので、これらを溶液に浸漬して用いる場合には、有効濃度以下にならないように注意すること。

2)使用時：

ア. 血清、胆汁等の有機性物質は殺菌作用を減弱させるので、これらが付着している場合は、十分に洗い落してから使用すること。

イ. 石けん類は本剤の殺菌作用を減弱させるので、石けん分を洗い落してから使用すること。

ウ. 皮膚消毒に使用する綿球、ガーゼ等は滅菌保存し、使用時に溶液に浸すこと。

3)器具等材質：

ア. 合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具、鏡器具、塗装カテーテル等への使用は避けることが望ましい。

※イ. 金属器具を長時間浸漬する必要がある場合は、腐蝕を防止するためにベンゼトニウム塩化物0.1%溶液に0.5～1.0%の亜硝酸ナトリウムを添加すること。

ウ. 皮革製品の消毒に使用すると、変質させることがあるので、使用しないこと。

【取扱以上の注意】

〈注意〉

- (1)開封時及び開封後は、微生物による汚染に注意すること。
- (2)本剤は滅菌製剤のため、開封後は速やかに使用すること。

0.1

開封日 年 月 日

※※2014年2月改訂（第4版）  
 ※ 2008年5月改訂  
 日本標準商品分類番号 872616

承認番号 (8AM)537  
 薬価収載 1996年7月  
 販売開始 1996年9月  
 ※※再評価結果 1982年8月

0.1

外用殺菌消毒剤

滅菌製剤

# ベゼトン®液0.1

※ 日本薬局方 ベンゼトニウム塩化物液

BEZETON® SOLUTION 0.1

500mL



健栄製薬株式会社

大阪市中央区伏見町2丁目5番8号  
 電話番号 06(6231)5626

貯法：気密容器  
 避光して室温保存  
 注意：「取扱以上の注意」  
 の項参照

※【組成・性状】 100mL中 ベンゼトニウム塩化物0.1g含有（0.1w/v%）。

添加物としてpH調整剤を含有する。  
 無色澄明の液で、においはない。滅菌製剤である。

【薬効薬理】

芽胞のない細菌、一部の真菌類に広く抗菌力を有し、グラム陽性菌には陰性菌より低濃度で効果を示す。

一方、結核菌及び大部分のウイルスに対する効果は期待できない。

※【効能・効果】【用法・用量】

効能・効果	用法・用量
手指・皮膚の消毒	通常石けんで十分に洗浄し、水で石けん分を十分に洗い落した後、ベンゼトニウム塩化物0.05～0.1%溶液に浸して洗い、滅菌ガーゼあるいは布片で清拭する。術前の手洗の場合には、5～10分間ブラッシングする。
手術部位（手術野）の皮膚の消毒	手術前局所皮膚面を、ベンゼトニウム塩化物0.1%溶液で約5分間洗い、その後ベンゼトニウム塩化物0.2%溶液を塗布する。
手術部位（手術野）の粘膜の消毒、皮膚・粘膜の創傷部位の消毒	ベンゼトニウム塩化物0.01～0.025%溶液を用いる。
感染皮膚面の消毒	ベンゼトニウム塩化物0.01%溶液を用いる。
医療機器の消毒	ベンゼトニウム塩化物0.1%溶液に10分間浸漬するか、または厳密に消毒する際には、器具を予め2%炭酸ナトリウム水溶液で洗い、その後ベンゼトニウム塩化物0.1%溶液中で15分間煮沸する。
手術室・病室・家具・器具・物品などの消毒	ベンゼトニウム塩化物0.05～0.1%溶液を布片で塗布・清拭するか、または噴霧する。
腔洗浄	ベンゼトニウム塩化物0.025%溶液を用いる。
結膜嚢の洗浄・消毒	ベンゼトニウム塩化物0.02%溶液を用いる。

Ⓢ登録商標

製造番号  
 使用期限

ト  
 調剤包装単位用コード  
 0111111101111

ト  
 販売包装単位用コード  
 0111111101111

ゴム：パッキン



キャップ：PP  
 ボトル：PP