

## 外用殺菌消毒剤

劇

日本薬局方

# ヨードチンキ

ヨードチンキ「ケンエー」

第二石油類 \* 水溶性 \* 危険等級Ⅲ \* 火気厳禁

Iodine Tincture

## 500mL

※規制区分：劇薬

貯法：気密容器  
火気を避けて  
室温保存



健栄製薬株式会社

大阪市中央区伏見町2丁目5番8号  
電話番号 06(6231)5626

【禁忌 (次の患者には使用しないこと)】  
本剤又はヨウ素に対し過敏症の既往歴のある患者

### 【組成・性状】

#### 【組成】

1 mL中 ヨウ素60mgを含有する酒精剤である。  
添加物としてヨウ化カリウム、エタノールを含有する。

#### 【性状】

暗赤褐色の液で、特異なにおいがある。

#### 【効能・効果】

- 皮膚表面の一般消毒
- 創傷・潰瘍の殺菌・消毒
- 歯肉及び口腔粘膜の消毒、根管の消毒

#### 【用法・用量】

5～10倍に希釈し、1日2～3回患部及び皮膚に適量塗布する。

#### 【使用上の注意】

##### 1. 重要な基本的注意

- (1) 深い創傷に使用する場合の希釈液としては注射用水か滅菌精製水を用い、水道水や精製水を用いないこと。
- (2) 同一部位に反復使用した場合には、表皮の剥離を伴う急性の皮膚炎を起こすことがあるので注意すること。

##### 2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

製造  
番号  
使用  
期限

- (1) 過敏症：ヨード疹等の過敏症状 (頻度不明) があらわれることがあるので、このような場合には使用を中止し、適切な処置を行うこと。
- (2) 皮膚：刺激症状 (頻度不明) があらわれることがあるので、このような場合には使用を中止すること。
3. 臨床検査結果に及ぼす影響  
血漿蛋白結合ヨード (PBI) 及び甲状腺放射性ヨード摂取率の検査値に影響を及ぼすことがある。
4. 適用上の注意  
(1) 投与経路：外用にのみ使用し、内服しないこと。  
(2) 使用時：  
1) 眼に入らないよう注意すること。  
眼に入った場合には水でよく洗い流すこと。  
2) 粘膜、創傷面又は炎症部位に長期間又は広範囲に使用しないこと。  
3) 口腔内に使用するときは、患部を乾燥させて塗布すること。

調剤包装単位用  
01111111011111

販売包装単位用  
01111111011111

ガラス：瓶



キャップ：PP  
パッキン：PE,PP

# 日本薬局方 ヨードチンキ