消毒用エタプラス® 第３類医薬品

折りたたんで廃棄しやすいボトルを採用

省資源・ゴミ削減のため、減容後の容積は約1/4になります。

①折り目に沿ってつぶしてください。
②空気が入らないよう、キャップをしめてください。



キャップ：PP
パッキン：PE,PP
ボ ト ル：PE
ラ ベ ル：PE

折り目

目安
400
300
200
100

開封日
年　月　日

殺菌消毒薬

第３類医薬品

消毒用エタプラス®

アルコール類＊水溶性＊危険等級Ⅱ

ETHAPLUS® FOR DISINFECTION

500mL

飲用不可

火気厳禁

貯法：気密容器
火を避けて
室温保存

健栄製薬株式会社
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号　06(6231)5626

消毒用エタプラスは、エタノール（C_2H_6O）76.9～81.4vol％を含有する殺菌消毒薬です。
溶剤としてイソプロパノール4.9vol％、湿潤剤としてグリセリン0.9w/v％を含有する無色澄明の液で、特異なにおい及びやくような味があります。

⚠使用上の注意

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

次の部位には使用しないでください

(1)損傷のある皮ふ。
(2)目の周囲、粘膜等。

相談すること

1．次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2．使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症　状
皮　ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ、灼熱感

〔効能効果〕
手指・皮膚の殺菌・消毒

〔用法用量〕
塗擦又はガーゼ、脱脂綿等に浸して清拭してください。

〈用法用量に関連する注意〉
(1)用法用量を厳守してください。
(2)局所刺激作用があるので、軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して貼付しないでください。

（右側面へ続く↗）

4 987286 200156 C

見本 80%

折り目

消毒用エタプラス® 第３類医薬品

（↖左側面より続く）

(3)過度に使用すると、脱脂等による皮ふ荒れを起こすことがあります。
(4)広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意してください。
(5)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(6)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
(7)外用にのみ使用してください。

〔組成性状〕

有効成分	エタノール（C_2H_6O）	76.9～81.4vol％
添加物	イソプロパノール（溶剤）	4.9vol％
	グリセリン（湿潤剤）	0.9w/v％
性　状	無色澄明の液で、特異なにおい及びやくような味があります。	

〈成分に関連する注意〉
アレルギーテストの検査を受ける場合には、本剤を使用していることを医師に知らせてください。（アレルギーテストの検査値に影響をおよぼすことがあります。）

〔保管及び取扱い上の注意〕
(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
(4)火気に近づけないでください。
(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
(6)開封時、容器の肩部又は底部をもち、液がとびださないように、キャップを開けてください。
(7)薬剤が床や家具等に付着しないようにしてください。（変質又は変色のおそれがあります。）

Ⓡ登録商標

副作用被害救済制度の問合せ先
（独）医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）