

使用上の注意改訂のお知らせ

2020年5月
健栄製薬株式会社
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号

制酸剤

日本薬局方

沈降炭酸カルシウム

沈降炭酸カルシウム「ケンエー」

この度、標記製品につきまして「使用上の注意」を改訂致しましたのでお知らせ申し上げます。今後のご使用に際しましてご参照下さいますようお願い申し上げます。

なお、使用上の注意を改訂した製品がお手元に届くまでには、流通在庫の関係から若干の日数を必要と致しますので、ご了承下さいますようお願い申し上げます。

■改訂内容（自主改訂：_____部）

改訂後			改訂前		
【使用上の注意】			【使用上の注意】		
1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること） （省略）			1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること） （省略）		
2. 相互作用 併用注意（併用に注意すること） 本剤は吸着作用、制酸作用等を有しているため、他の薬剤の吸収・排泄に影響を与えることがある。			2. 相互作用 併用注意（併用に注意すること） 本剤は吸着作用、制酸作用等を有しているため、他の薬剤の吸収・排泄に影響を与えることがある。		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
（省略）	（省略）	（省略）	（省略）	（省略）	（省略）
大量の牛乳	（省略）	（省略）	大量の牛乳	（省略）	（省略）
ロキサデュスタット	ロキサデュスタットと併用した場合、ロキサデュスタットの作用が減弱するおそれがあるため、併用する場合は、前後1時間以上あけて本剤を服用すること。	ロキサデュスタットを酢酸カルシウムと同時投与したところ、ロキサデュスタットのAUC _{inf} が低下した。			
3. 副作用 （省略）			3. 副作用 （省略）		
4. 高齢者への投与 （省略）			4. 高齢者への投与 （省略）		

■改訂理由

- ・「相互作用」の「併用注意」の項に「ロキサデュスタット」を追記
ロキサデュスタットの添付文書において「多価陽イオンを含有する経口薬剤（カルシウム、鉄、マグネシウム、アルミニウム等を含む製剤）」との相互作用について注意喚起されていることから、本剤においても同様に改訂し整合性を図ることにしました。

■今回の改訂内容につきましては医薬品安全対策情報（DSU）No. 289に掲載される予定です。

■改訂された添付文書につきましては、下記ホームページに掲載しておりますので、併せてご参照いただきますようお願い申し上げます。

PMDAホームページ「医薬品に関する情報（<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>）」
健栄製薬株式会社ホームページ「医療関係者様向けサイト（<https://www.kenei-pharm.com/medical/>）」