

貯法：気密容器・室温保存
使用期限：容器等に表示

承認番号	(17AP) 213
承認年月	2005年3月
販売開始	2005年11月

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

第3類医薬品

外用殺菌消毒剤

滅菌製剤

ポピコット[®]綿球P

(10%ポビドンヨード液含浸綿球)

△ 使用上の注意

- ※ 【してはいけないこと】
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
 - ※ 次の人は使用しないでください
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - ※ 【相談すること】
 - ※ 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3) 患部が広範囲の人。
(4) 深い傷やひどいやけどの人。
 - ※ 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- | 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
- まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。
- | 症状の名称 | 症 状 |
|--------------------|---|
| ショック
(アナフィラキシー) | 使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。 |
- ※ 3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効 能 効 果】

きり傷、さし傷、すりむき傷、靴ずれ、やけど等の患部の殺菌・消毒。
とびひ、おでき等の感染皮膚面の殺菌・消毒。

【用 法 用 量】

1 日数回患部に塗布。

〈用法用量に関連する注意〉

- (1) 用法用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。

- (4) 石けん類は本剤の殺菌作用を弱めるので、石けん分を洗い流してから使用してください。
- (5) 外用にのみ使用してください。

※※【成 分】

# 14 綿球	綿球 1 球 (脱脂綿 0.18 g) あたり 10 w/v%ポビドンヨード液 1.8 mL含浸
# 20 綿球	綿球 1 球 (脱脂綿 0.44 g) あたり 10 w/v%ポビドンヨード液 4.4 mL含浸

添加物：グリセリン、クエン酸水和物、リン酸水素 2 Na、ラウロマクロゴール、pH調整剤

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えしないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 衣類等に付着したときは、すぐに水で洗い流してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (6) 開封時及び開封後は、微生物による汚染に注意してください。
綿球は清潔なピンセット等を用いて使用し、綿球に指が触れないよう注意してください。
- (7) 開封後は速やかに使用してください。

【消費者相談窓口】

健栄製薬株式会社 学術情報部
〒541-0044 大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 (06) 6231-5626
FAX番号 (06) 6204-0750

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)