

日本薬局方  
**無水エタノール**

(↗左側面より続く)

(2)その他

1)使用時：血清、臍汁等の蛋白質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療器具等に用いる場合には、十分に洗い落してから使用すること。

2)器具等材質：  
ア.合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具、鏡器具、塗装カーテール等には、変質するものがあるので、このような器具は長時間浸漬しないこと。

イ.金属器具を長時間浸漬する必要がある場合には、腐蝕を防止するために2.0～1.0%の亜硝酸ナトリウムを添加すること。

3)その他注意

承認外の経皮的エタノール注入療法(PEIT) 使用例で、注入時の疼痛、酩酊感、発熱、本剤の局所外流出による重篤な胆道・腹腔内等での出血、肝梗塞、肝不全等が報告されている。

[薬効薬理]

本剤は、使用濃度において栄養型細菌(グラム陽性菌、グラム陰性菌)、酵母菌、ウイルス等には有効であるが、芽胞(炭疽菌、破傷風菌等)及び一部のウイルスに対する効果は期待できない。

※[取扱い上の注意]

〈注意〉

(1)引火性、爆発性があるため、火気(電気メス使用等も含む)には十分注意すること。

(2)衣類等につくと脱色、変色があるので注意すること。

ガラス：瓶



キャップ：PP  
パッキン：PE,PP  
ラベル：PS,PET

※※ 2007年4月改訂(第2版)  
※ 2000年5月改訂  
[日本標準商品分類番号 872615]

承認番号 (61AM)1532  
販価収載 1986年3月  
販売開始 1994年11月  
再評価結果 1982年8月

殺菌消毒剤 日本薬局方  
**無水エタノール**  
無水エタノール「ケンエー」  
アルコール類＊水溶性＊危険等級II＊火気厳禁

※※ Anhydrous Ethanol

500mL

**健栄製薬株式会社**  
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号  
電話番号 06(6231)5626

貯法： 気密容器  
遮光して、火気を  
避けて室温保存  
注意：「取扱い上の注意」  
の項参照

＜開封包装単位用コード＞  
01111111011111  
＊

＜開封包装単位用コード＞  
01111111011111  
＊

製造番号

使用期限

〔禁忌(次の部位には使用しないこと)〕  
損傷皮膚及び粘膜 [損傷皮膚及び粘膜への使用により、刺激作用を有する。]

※※〔組成・性状〕

エタノール ( $C_2H_5O$ ) 99.5 vol%以上を含有する。  
無色透明の液である。

※※〔効能・効果〕

手指・皮膚の消毒、手術部位(手術野)の皮膚の消毒、医療機器の消毒

〔用法・用量〕

本品を精製水でうすめて、エタノールとして76.9～81.4 vol%とし、これを消毒部位に塗布する。

※〔使用上の注意〕

1.重要な基本的注意

(1)眼に入らないように注意すること。  
眼に入った場合には水でよく洗い流すこと。

(2)広範囲又は長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。

2.副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

(1)過敏症：発疹等の過敏症状(頻度不明)があらわれることがあるので、このような場合には使用を中止し、適切な処置を行ふこと。

(2)皮膚：刺激症状(頻度不明)があらわれることがあるので、このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

3.適用上の注意

(1)人体

1)投与経路：原液又は濃厚液は刺激作用があるので経口投与しないこと。

2)使用時：同一部位(皮膚面)に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので、注意すること。

(右側面へ続く↗)