

ディスポーザブル グリセリン浣腸剤

ケンエーG浣腸液50%の使用法

1

本品をそのまま温湯に入れ、
約40℃（体温程度）に温めます。

☆温め方の目安☆

50℃の温湯を使用
30 mL：2分30秒
40 mL：3分
60 mL：3分30秒
120 mL：4分




※容器変形の原因となりますので、60℃以上の温湯はご使用にならないで下さい。

2

チューブの目盛（3, 6, 10cm）を目安にして、ストッパーを
スライドさせ挿入する深さに合わせます。


- 成人の場合：6～10cm
- 小児の場合：3～6cm
- 乳児の場合：3～4cm

ストッパー




3

チューブの先端部をしっかり持ち、キャップを
まわすように取りはずし、ストッパーより
先端の挿入部を少量の内容液等で潤します。



潤滑剤を塗布



4


成人

容器内の空気を追い出し、体位は左下横向きの状態にして、チューブをストッパーの位置までゆっくりと肛門内に挿入します。



小児

容器内の空気を追い出し、小児または乳児の両足を持ち上げ膝を曲げさせて、チューブをストッパーの位置までゆっくりと肛門内に挿入します。




5

ストッパーを片方の手で固定し、浣腸液をゆっくり注入します。注入後、チューブを静かに抜き、肛門部を脱脂綿等で押さえて、3～10分後、便意が強まってから排便すると効果的です。

成人



小児



- ★ 注 意 ★
1. 無理に挿入すると直腸粘膜を傷つけるおそれがあるので、注意してください。
 2. 浣腸液はゆっくり注入してください。