

識別性に配慮した着色塩化ベンザルコニウム製剤

外用殺菌消毒剤

(塩化ベンザルコニウム製剤)

ザルコニン®G消毒液10

塩化ベンザルコニウム 10 w/v%液


ZALKONIN®G DISINFECTANT SOLUTION 10

ザルコニンG消毒液10は、消毒剤の誤使用による医療事故に対応するため、薬液を緑色に着色し、識別性を向上させた塩化ベンザルコニウム10 w/v%製剤です。

医療過誤のリスクを
減らすために…



● 希釈溶液の色調 ●



0.2% 溶液 (本品の 50 倍希釈)

0.1% 溶液 (本品の 100 倍希釈)

0.05% 溶液 (本品の 200 倍希釈)

(塩化ベンザルコニウムとしての濃度)

〔注意〕

- 経口投与しないこと。
- 浣腸には使用しないこと。

〔要約〕

詳細は、D.I. 欄又は製品添付文書等をご参照ください。

■ 包装 …………… 500 mL

DRUG INFORMATION

商品名	和名	ザルコニン® G消毒液 10												
	洋名	ZALKONIN®G DISINFECTANT SOLUTION 10												
製造販売元	健栄製薬株式会社	承認番号	(15 AM) 333											
日本標準商品分類番号	872616	承認年月	2003年3月											
薬効分類	外用殺菌消毒剤	薬価基準収載年月	2003年7月											
規制区分	普通薬	販売開始年月	2003年8月											
※組成・性状	<p>100mL中 塩化ベンザルコニウム 10g含有 (10w/v%)。添加物として緑色201号、黄色4号 (タートラジン) を含有する。濃緑色澄明の液で、特異なおいがある。振ると強く泡立つ。</p> <p style="text-align: right;">※2005年9月改訂</p>													
効能・効果 用法・用量	<table border="1"> <thead> <tr> <th>効能・効果</th> <th>用法・用量 (本品の希釈倍数)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>手指・皮膚の消毒</td> <td>通常石けんで十分に洗浄し、水で石けん分を十分に洗い落した後、塩化ベンザルコニウム 0.05～0.1%溶液 (100～200倍) に浸して洗い、滅菌ガーゼあるいは布片で清拭する。術前の手洗の場合には、5～10分間ブラッシングする。</td> </tr> <tr> <td>手術部位 (手術野) の皮膚の消毒</td> <td>手術前局所皮膚面を塩化ベンザルコニウム 0.1%溶液 (100倍) で約5分間洗い、その後塩化ベンザルコニウム 0.2%溶液 (50倍) を塗布する。</td> </tr> <tr> <td>医療用具の消毒</td> <td>塩化ベンザルコニウム 0.1%溶液 (100倍) に10分間浸漬するか、または厳密に消毒する際は、器具を予め2%炭酸ナトリウム水溶液で洗い、その後塩化ベンザルコニウム 0.1%溶液中 (100倍) で15分間煮沸する。</td> </tr> <tr> <td>手術室・病室・家具・器具・物品などの消毒</td> <td>塩化ベンザルコニウム 0.05～0.2%溶液 (50～200倍) を布片で塗布・清拭するか、または噴霧する。</td> </tr> </tbody> </table>				効能・効果	用法・用量 (本品の希釈倍数)	手指・皮膚の消毒	通常石けんで十分に洗浄し、水で石けん分を十分に洗い落した後、塩化ベンザルコニウム 0.05～0.1%溶液 (100～200倍) に浸して洗い、滅菌ガーゼあるいは布片で清拭する。術前の手洗の場合には、5～10分間ブラッシングする。	手術部位 (手術野) の皮膚の消毒	手術前局所皮膚面を塩化ベンザルコニウム 0.1%溶液 (100倍) で約5分間洗い、その後塩化ベンザルコニウム 0.2%溶液 (50倍) を塗布する。	医療用具の消毒	塩化ベンザルコニウム 0.1%溶液 (100倍) に10分間浸漬するか、または厳密に消毒する際は、器具を予め2%炭酸ナトリウム水溶液で洗い、その後塩化ベンザルコニウム 0.1%溶液中 (100倍) で15分間煮沸する。	手術室・病室・家具・器具・物品などの消毒	塩化ベンザルコニウム 0.05～0.2%溶液 (50～200倍) を布片で塗布・清拭するか、または噴霧する。
効能・効果	用法・用量 (本品の希釈倍数)													
手指・皮膚の消毒	通常石けんで十分に洗浄し、水で石けん分を十分に洗い落した後、塩化ベンザルコニウム 0.05～0.1%溶液 (100～200倍) に浸して洗い、滅菌ガーゼあるいは布片で清拭する。術前の手洗の場合には、5～10分間ブラッシングする。													
手術部位 (手術野) の皮膚の消毒	手術前局所皮膚面を塩化ベンザルコニウム 0.1%溶液 (100倍) で約5分間洗い、その後塩化ベンザルコニウム 0.2%溶液 (50倍) を塗布する。													
医療用具の消毒	塩化ベンザルコニウム 0.1%溶液 (100倍) に10分間浸漬するか、または厳密に消毒する際は、器具を予め2%炭酸ナトリウム水溶液で洗い、その後塩化ベンザルコニウム 0.1%溶液中 (100倍) で15分間煮沸する。													
手術室・病室・家具・器具・物品などの消毒	塩化ベンザルコニウム 0.05～0.2%溶液 (50～200倍) を布片で塗布・清拭するか、または噴霧する。													
希釈方法	<p>50倍液…キャップで下記に示す位置まで本品を4杯とり、水1Lにうすめる。 以下同様にうすめる。 100倍液……………本品2杯に水1L 200倍液……………本品1杯に水1L</p>  <p>(キャップ)</p>													
使用上の注意 〔使用上の注意の改訂に十分留意すること。〕	<p>1. 重要な基本的注意</p> <p>(1) 本剤は必ず希釈し、濃度に注意して使用すること。 (2) 炎症又は易刺激性の部位 (陰股部等) に使用する場合には、正常の部位に使用するよりも低濃度とすることが望ましい。</p> <p>2. 副作用 本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。 過敏症：発疹、痒痒感等の過敏症状 (頻度不明) があらわれることがあるので、このような場合には使用を中止し、適切な処置を行うこと。</p> <p>3. 臨床検査結果に及ぼす影響 本剤で消毒したカテーテルで採取した尿は、スルホサリチル酸法による尿蛋白試験で偽陽性を示すことがある。</p> <p>4. 適用上の注意</p> <p>(1) 人体</p> <p>1) 投与経路： 経口投与しないこと。洗腸には使用しないこと。</p> <p>2) 使用時： ア. 原液又は濃厚液が眼に入らないように注意すること。眼に入った場合には水でよく洗い流すこと。 イ. 濃厚液の使用により、皮膚の刺激症状があらわれることがあるので、注意すること。 ウ. 炎症部位に長期間又は広範囲に使用しないこと (全身吸収による筋脱力を起こすおそれがある)。 エ. 密封包帯、ギプス包帯、パックに使用すると刺激症状があらわれることがあるので、使用しないことが望ましい。</p> <p>(2) その他</p> <p>1) 調製方法： ア. 希釈液として塩類含量の多い水又は硬水を用いる場合には、通常用いる濃度の1.5～2倍の溶液として使用すること。 イ. 繊維、布 (綿、ガーゼ、ウール、レーヨン等) は本剤の成分である塩化ベンザルコニウムを吸着するので、これらを溶液に浸漬して用いる場合には、有効濃度以下とならないように注意すること。</p> <p>2) 使用時： ア. 血清、膿汁等の有機性物質は殺菌作用を減弱させるので、これらが付着している場合は、十分に洗い落してから使用すること。 イ. 石けん類は本剤の殺菌作用を減弱させるので、石けん分を洗い落してから使用すること。 ウ. 皮膚消毒に使用する綿球、ガーゼ等は滅菌保存し、使用時に溶液に浸すこと。</p> <p>3) 器具等材質： ア. 合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具、鏡器具、塗装カテーテル等への使用は避けることが望ましい。 イ. 金属器具を長時間浸漬する必要がある場合は、腐蝕を防止するために塩化ベンザルコニウム 0.1%溶液に0.5～1.0%の亜硝酸ナトリウムを添加すること。 ウ. 皮革製品の消毒に使用すると、変質させることがあるので、使用しないこと。</p>													
薬効薬理	本剤は使用濃度において、栄養型細菌 (グラム陽性菌、グラム陰性菌)、一部の真菌等には有効であるが、結核菌及び大部分のウイルスに対する効果は期待できない。													
取扱い上の注意	〈貯法〉 気密容器・室温保存 〈使用期限〉 容器等に表示													
包装	500 mL													

[詳細は添付文書等をご参照ください。]

文献請求先

健栄製薬株式会社 学術情報部
〒541-0044 大阪市中央区伏見町2丁目5番8号 電話番号06(6231)5626