

単包装の消毒剤含浸綿球シリーズ

外皮消毒剤

滅菌製剤

ザルコニン[®]0.025%綿球C

0.025%塩化ベンザルコニウム液含浸綿球

ZALKONIN[®] 0.025% COTTON BALL C

滅菌済・単包装の消毒剤含浸綿球製剤なので、

1. 調製の手間が不要で、院内製剤業務の省力化が可能です。
2. 微生物汚染の心配がなく、衛生的です。
3. 開封後直ちに使用でき、在宅医療等にも適しています。
4. 消毒剤や綿球の無駄な消費をなくすことができます。



ザルコニン[®]0.025%綿球C

ZALKONIN[®] 0.025% COTTON BALL C

塩化ベンザルコニウムは、グラム陽性菌・グラム陰性菌等に広範囲に抗微生物スペクトルを有する第四級アンモニウム塩系の殺菌消毒剤で、その0.025 w/v%液を含浸させた綿球は、院内において粘膜や創傷部位の消毒等に広く用いられています。

しかし、院内で調製する際には、消毒剤・滅菌綿球の準備、万能壺の洗浄・滅菌等の手間や経費がかかり、また、調製後は微生物汚染に十分に注意し、使用期限を管理する必要があります。

ザルコニン0.025%綿球Cは、0.025 w/v%塩化ベンザルコニウム液を綿球に含浸させ、蒸気滅菌した単包装の綿球製剤なので、調製の手間を省き、簡単かつ衛生的に使用できます。

特性

1

院内製剤業務の省力化

消毒剤・滅菌綿球の準備、万能壺の洗浄・滅菌等が不要なので、院内製剤業務の省力化が可能です。

2

滅菌済

滅菌製剤なので、微生物汚染による感染の心配がありません。

3

衛生的

単包装の使い切りなので、消毒剤や綿球の継ぎ足し等の不衛生な使用を防止し、衛生的に使用することができます。また、調製後の使用期限等の管理も不要です。

4

簡単

1回の処置に必要な個数の綿球をとり、開封後直ちに使用することができます。また、携帯にも便利で、いつでも、どこでも手軽に使用でき、往診、訪問看護や在宅医療にも適しています。

5

経済的

使い残しがなく、消毒剤や綿球の無駄な消費をなくすることができます。

● 使用方法 ●



使用する綿球分の容器を、ねじり様に折り取って使用します。




フィルムは1球ずつ開封して使用することができます。



フィルムはまとめて開封して使用することもできます。

皮膚消毒効果 (in vivo試験)

各種細菌で汚染させた皮膚に対するザルコニン0.025%綿球Cの消毒効果を試験した結果、いずれの細菌に対しても、97%以上の平均減菌率を示し、優れた消毒効果が確認されました¹⁾。



〈方法〉

両腕内側部を被験部位とし、滅菌したステンレス製円筒内に供試菌液を塗布した。乾燥後、ザルコニン0.025%綿球Cを用いて15秒間清拭塗布し、塗布後の生残菌数を求め、被験者5名の平均減菌率を用いて評価した。

●健栄製薬株式会社 社内資料

成分

# 20 綿球	綿球 1 球 (脱脂綿 0.44 g) あたり 0.025 w/v%塩化ベンザルコニウム液 4.4 mL 含浸
---------	--

綿球の大きさ (実物大)



効能効果、用法用量

●効能効果

すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒

●用法用量

1日数回患部に塗布する。

包装

20 綿球 × 1 球 × 90 (6 連球 × 15)

ザルコニン®0.025%綿球Cの INFORMATION

商品名	和名	ザルコニン®0.025%綿球C						
	洋名	ZALKONIN®0.025% COTTON BALL C						
製造販売元	健栄製薬株式会社	承認番号	(17D)1166					
分類	外皮消毒剤	承認年月	2005年6月					
区分	医薬部外品	販売開始年月	2005年9月					
成分	<table border="1"> <tr> <td>#20綿球</td> <td>綿球1球(脱脂綿0.44g)あたり 0.025w/v%塩化ベンザルコニウム液4.4mL含浸</td> </tr> </table>				#20綿球	綿球1球(脱脂綿0.44g)あたり 0.025w/v%塩化ベンザルコニウム液4.4mL含浸		
#20綿球	綿球1球(脱脂綿0.44g)あたり 0.025w/v%塩化ベンザルコニウム液4.4mL含浸							
効能効果	すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒							
用法用量	<p>1日数回患部に塗布する。</p> <p>〈用法用量に関連する注意〉</p> <p>(1)用法用量を厳守すること。 (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。 (3)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。 なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。 (4)綿球を患部に貼付しないこと。 (5)石けん類は本剤の殺菌作用を弱めるので、石けん分を洗い流してから使用すること。 (6)外用にのみ使用し、内服しないこと。</p>							
使用上の注意	<p>〔してはいけないこと〕 (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる) 次の人は使用しないこと (1)患部が広範囲の人。 (2)深い傷やひどいやけどの人。 〔相談すること〕 1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること (1)医師の治療を受けている人。 (2)本人又は家族がアレルギー体質の人。 (3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、添付文書等を持って医師又は薬剤師に相談すること (1)使用后、次の症状があらわれた場合</p> <table border="1"> <tr> <td>関係部位</td> <td>症状</td> </tr> <tr> <td>皮膚</td> <td>発疹・発赤、かゆみ</td> </tr> </table> <p>(2)5～6日間使用しても症状がよくなる場合</p>				関係部位	症状	皮膚	発疹・発赤、かゆみ
関係部位	症状							
皮膚	発疹・発赤、かゆみ							
保管及び取扱い上の注意	<p>〈貯法〉気密容器・室温保存 〈使用期限〉容器等に表示</p> <p>(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。 (2)小児の手の届かない所に保管すること。 (3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。) (4)使用期限の過ぎた製品は使用しないこと。 (5)開封時及び開封後は、微生物による汚染に注意すること。 綿球は清潔なピンセット等を用いて使用し、綿球に指が触れないよう注意すること。 (6)開封後は速やかに使用すること。 (7)綿の表面又は内部に、小さなしみのような黒又は黄色の斑点状のものは、ワタの種子である。(変質したものではない。)</p>							
包装	#20綿球×1球×90							

[詳細は添付文書等をご参照ください。]

参考文献

1) 健栄製薬株式会社 社内資料

文献請求先

健栄製薬株式会社 学術情報部
〒541-0044 大阪市中央区伏見町2丁目5番8号 電話番号06(6231)5626