第２類医薬品

単包装の消毒剤含浸綿球シリーズ

外用殺菌消毒剤

滅菌製剤

ステリクロン®0.05%綿球P

0.05%クロルヘキシジングルコン酸塩液含浸綿球

STERICLON® 0.05% COTTON BALL P

滅菌済・単包装の消毒剤含浸綿球製剤なので、

1．調製の手間が不要で、院内製剤業務の省力化が可能です。
2．微生物汚染の心配がなく、衛生的です。
3．開封後直ちに使用でき、在宅医療等にも適しています。
4．消毒剤や綿球の無駄な消費をなくすことができます。

健栄製薬株式会社
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号

2009年8月作成

09.08.30K

外用殺菌消毒剤

第２類医薬品

ステリクロン®0.05%綿球P

STERICLON® 0.05% COTTON BALL P

クロルヘキシジングルコン酸塩は、グラム陽性菌、グラム陰性菌等に広範囲に抗微生物スペクトルを有するビグアナイド系の殺菌消毒剤で、その０.０５ｗ/ｖ%液を含浸させた綿球は、院内において皮膚の創傷部位の消毒等に広く用いられています。
しかし、院内で調製する際には、消毒剤・滅菌綿球の準備、万能壺の洗浄・滅菌等の手間や経費がかかり、また、調製後は微生物汚染に十分に注意し、使用期限を管理する必要があります。
ステリクロン０.０５%綿球Pは、０.０５ｗ/ｖ%クロルヘキシジングルコン酸塩液を綿球に含浸させ、蒸気滅菌した単包装の綿球製剤なので、調製の手間を省き、簡単かつ衛生的に使用できます。

特性

1 院内製剤業務の省力化

消毒剤・滅菌綿球の準備、万能壺の洗浄・滅菌等が不要なので、院内製剤業務の省力化が可能です。

2 滅菌済

開封前の無菌を保証した滅菌製剤なので、微生物汚染による感染の心配がありません。

3 衛生的

単包装の使い切りなので、消毒剤や綿球の継ぎ足し等の不衛生な使用を防止し、衛生的に使用することができます。また、調製後の使用期限等の管理も不要です。

4 簡単

１回の処置に必要な個数の綿球をとり、開封後直ちに使用することができます。また、携帯にも便利で、いつでも、どこでも手軽に使用でき、往診、訪問看護や在宅医療にも適しています。

5 経済的

使い残しがなく、消毒剤や綿球の無駄な消費をなくすことができます。

●使用方法●



使用する綿球分の容器を、ねじる様に折り取って使用します。

フィルムは１球ずつ開封して使用することができます。

フィルムはまとめて開封して使用することもできます。

皮膚消毒効果（*in vivo*試験）

各種細菌で汚染させた皮膚に対するステリクロン0.05％綿球Pの消毒効果を試験した結果、滅菌精製水含浸綿球による平均滅菌率は60～80％であったのに対し、ステリクロン0.05％綿球Pはいずれの細菌に対しても、90％以上の平均滅菌率を示し、優れた消毒効果が確認されました[1)]。



〈方法〉
両腕内側部を被験部位とし、滅菌したステンレス製円筒内に供試菌液を塗布した。乾燥後、ステリクロン0.05％綿球Pと、綿球1球あたり4.4mLの滅菌精製水を含浸させた綿球を用いて15秒間清拭塗布し、塗布後の生残菌数を求め、被験者5名の平均滅菌率を用いて評価した。

ステリクロン0.05％綿球P
滅菌精製水含浸綿球

●健栄製薬株式会社　社内資料：ステリクロン0.05％綿球Pの皮膚消毒効果について

成分

＃20綿球	綿球1球（脱脂綿0.44g）あたり 0.05w/v%クロルヘキシジングルコン酸塩液4.4mL含浸

綿球の大きさ（実物大）

効能効果、用法用量

●効能効果
すり傷、きり傷、かき傷、さし傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒

●用法用量
1日数回患部に塗布してください。

包装

＃20綿球×1球×90（6連球×15）

ステリクロン®0.05%綿球Pの DRUG INFORMATION

商品名	和名	ステリクロン®0.05%綿球P		
	洋名	STERICLON®0.05% COTTON BALL P		
製造販売元		健栄製薬株式会社		
日本標準商品分類番号		872619	承認番号	22100APX00558
薬効分類		外用殺菌消毒剤	承認年月	2009年7月
区分		第2類医薬品	販売開始年月	2009年8月

使用上の注意

〔相談すること〕

1．次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

(1)医師の治療を受けている人。
(2)本人又は家族がアレルギー体質の人。
(3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4)患部が広範囲の人。
(5)深い傷やひどいやけどの人。

2．次の場合は、直ちに使用を中止し、添付文書等を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1)使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

(2)5～6日間使用しても症状がよくならない場合

効能効果

すり傷、きり傷、かき傷、さし傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒

用法用量

1日数回患部に塗布してください。

〈用法用量に関連する注意〉
(1)用法用量を厳守してください。
(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
(4)石けん類は本剤の殺菌作用を弱めるので、石けん分を洗い流してから使用してください。
(5)外用にのみ使用してください。

成分

#20綿球	綿球1球（脱脂綿0.44g）あたり 0.05w/v%クロルヘキシジングルコン酸塩液4.4mL含浸

保管及び取扱い上の注意

〈貯法〉気密容器・室温保存
〈使用期限〉容器等に表示

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
(5)開封時及び開封後は、微生物による汚染に注意してください。
綿球は清潔なピンセット等を用いて使用し、綿球に指が触れないよう注意してください。
(6)開封後は速やかに使用してください。
(7)綿の表面又は内部にある小さなしみのような黒又は黄色の斑点状のものは、ワタの種子です。（変質したものではありません。）

包装

#20綿球×1球×90（6連球×15）

［詳細は添付文書等をご参照ください。］

主要文献

1）健栄製薬株式会社　社内資料：ステリクロン0.05%綿球Pの皮膚消毒効果について

文献請求先

主要文献に記載の社内資料につきましても下記にご請求下さい。
健栄製薬株式会社　学術情報部
〒541−0044　大阪市中央区伏見町2丁目5番8号　電話番号06（6231）5626　FAX番号06（6204）0750