

外用殺菌消毒剤

(塩化ベンゼトニウム製剤)

滅菌製剤

ベゼトン[®]液0.02・0.025・0.05・0.1・0.2

BEZETON[®] SOLUTION

日本薬局方 塩化ベンゼトニウム液

塩化ベンゼトニウムの
使用濃度水溶液(滅菌剤)
シリーズ。



ベゼトン[®]液0.02・0.025・0.05・0.1・0.2

塩化ベンゼトニウムは、グラム陽性菌・陰性菌等に広範囲に抗菌スペクトルを有する第四級アンモニウム系の殺菌消毒剤です。

ベゼトン液 0.02・0.025・0.05・0.1・0.2 は、この塩化ベンゼトニウムをそれぞれ 0.02%、0.025%、0.05%、0.1%、0.2% 含有する無色透明の水溶液で、高圧蒸気滅菌した製剤です。



- 識別を容易にするために、キャップとラベルの色調を濃度別に色分けしています。
- 500mL、1000mLは、ゴムパッキン方式のキャップなので、開栓はワンタッチです。

院内製剤業務の省力化に……

従来院内で行われていた計量・希釈・充てん・滅菌・ラベル表示・洗瓶乾燥等の手間が省けます。



希釈済





計量・希釈ミスの防止に。

用途に応じて各種濃度液がそのまま使用できます。
(更に希釈する場合には注意してください。)

滅菌済

院内感染の防止に。

消毒液の微生物汚染による感染の心配がありません。
(取扱い容器類からの汚染に注意してください。)

商品名 組成・性状 効能・効果	ベゼトン [®] 液0.02	ベゼトン [®] 液0.025	ベゼトン [®] 液0.05	ベゼトン [®] 液0.1	ベゼトン [®] 液0.2
					
	塩化ベンゼトニウムを 0.02% 含有する無色透明の水溶液 包装 500 mL	塩化ベンゼトニウムを 0.025% 含有する無色透明の水溶液 包装 500 mL、1000 mL、5 L	塩化ベンゼトニウムを 0.05% 含有する無色透明の水溶液 包装 500 mL	塩化ベンゼトニウムを 0.1% 含有する無色透明の水溶液 包装 500 mL	塩化ベンゼトニウムを 0.2% 含有する無色透明の水溶液 包装 500 mL
手指・皮膚の消毒	—	—	0.05% 溶液	0.05 ~ 0.1% 溶液	0.05 ~ 0.1% 溶液
手術部位（手術野）の皮膚の消毒	—	—	—	0.1% 溶液 ⇨ 0.2% 溶液	0.1% 溶液 ⇨ 0.2% 溶液
手術部位（手術野）の粘膜の消毒 皮膚・粘膜の創傷部位の消毒	0.01 ~ 0.02% 溶液	0.01 ~ 0.025% 溶液	0.01 ~ 0.025% 溶液	0.01 ~ 0.025% 溶液	0.01 ~ 0.025% 溶液
感染皮膚面の消毒	0.01% 溶液	0.01% 溶液	0.01% 溶液	0.01% 溶液	0.01% 溶液
医療用具の消毒	—	—	—	0.1% 溶液	0.1% 溶液
手術室・病室・家具・器具・物品などの消毒	—	—	0.05% 溶液	0.05 ~ 0.1% 溶液	0.05 ~ 0.2% 溶液
腔洗浄	—	0.025% 溶液	0.025% 溶液	0.025% 溶液	0.025% 溶液
結膜囊の洗浄・消毒	0.02% 溶液	0.02% 溶液	0.02% 溶液	0.02% 溶液	0.02% 溶液

(塩化ベンゼトニウムとしての濃度)

DRUG INFORMATION

商品名	和名	ベゼトン [®] 液0.02	ベゼトン [®] 液0.025	ベゼトン [®] 液0.05	ベゼトン [®] 液0.1	ベゼトン [®] 液0.2																																																																			
	洋名	BEZETON [®] SOLUTION 0.02	BEZETON [®] SOLUTION 0.025	BEZETON [®] SOLUTION 0.05	BEZETON [®] SOLUTION 0.1	BEZETON [®] SOLUTION 0.2																																																																			
製造発売元	健栄製薬株式会社																																																																								
日本標準品分類番号	872616																																																																								
薬効分類	外用殺菌消毒剤																																																																								
規制区分	普通薬																																																																								
承認番号	(8AM)538	(8AM)326	(8AM)325	(8AM)537	(8AM)327																																																																				
承認年月日	平成8年3月15日	平成8年3月15日	平成8年3月15日	平成8年3月15日	平成8年3月15日																																																																				
薬価基準	薬価基準収載																																																																								
組成	本品100mL中 塩化ベンゼトニウム0.02g含有(0.02%)。	本品100mL中 塩化ベンゼトニウム0.025g含有(0.02%)。	本品100mL中 塩化ベンゼトニウム0.05g含有(0.05%)。	本品100mL中 塩化ベンゼトニウム0.1g含有(0.1%)。	本品100mL中 塩化ベンゼトニウム0.2g含有(0.2%)。																																																																				
効能・効果 用法・用量	<table border="1"> <thead> <tr> <th>効能・効果</th> <th>用法・用量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>手術部位(手術野)の皮膚の消毒</td> <td>塩化ベンゼトニウム0.01~0.02%溶液を用いる。</td> </tr> <tr> <td>腫瘍の洗浄</td> <td>塩化ベンゼトニウム0.01%溶液を用いる。</td> </tr> <tr> <td>結膜囊の洗浄・消毒</td> <td>塩化ベンゼトニウム0.02%溶液を用いる。</td> </tr> </tbody> </table>	効能・効果	用法・用量	手術部位(手術野)の皮膚の消毒	塩化ベンゼトニウム0.01~0.02%溶液を用いる。	腫瘍の洗浄	塩化ベンゼトニウム0.01%溶液を用いる。	結膜囊の洗浄・消毒	塩化ベンゼトニウム0.02%溶液を用いる。	<table border="1"> <thead> <tr> <th>効能・効果</th> <th>用法・用量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>手術部位(手術野)の皮膚の消毒</td> <td>塩化ベンゼトニウム0.01~0.025%溶液を用いる。</td> </tr> <tr> <td>感染皮膚面の消毒</td> <td>塩化ベンゼトニウム0.01%溶液を用いる。</td> </tr> <tr> <td>腫瘍の洗浄</td> <td>塩化ベンゼトニウム0.025%溶液を用いる。</td> </tr> <tr> <td>結膜囊の洗浄・消毒</td> <td>塩化ベンゼトニウム0.02%溶液を用いる。</td> </tr> </tbody> </table>	効能・効果	用法・用量	手術部位(手術野)の皮膚の消毒	塩化ベンゼトニウム0.01~0.025%溶液を用いる。	感染皮膚面の消毒	塩化ベンゼトニウム0.01%溶液を用いる。	腫瘍の洗浄	塩化ベンゼトニウム0.025%溶液を用いる。	結膜囊の洗浄・消毒	塩化ベンゼトニウム0.02%溶液を用いる。	<table border="1"> <thead> <tr> <th>効能・効果</th> <th>用法・用量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>手指・皮膚の消毒</td> <td>通常石けんで十分に洗浄し、水で石けん分を十分に洗い流した後、塩化ベンゼトニウム0.05~0.1%溶液に浸して洗い、滅菌ガーゼあるいは布片で清拭する。術前の手洗の場合には、5~10分間ブラッシングする。</td> </tr> <tr> <td>手術部位(手術野)の皮膚の消毒</td> <td>塩化ベンゼトニウム0.01~0.025%溶液を用いる。</td> </tr> <tr> <td>感染皮膚面の消毒</td> <td>塩化ベンゼトニウム0.01%溶液を用いる。</td> </tr> <tr> <td>手術室・病室・家具・器具・物品などの消毒</td> <td>塩化ベンゼトニウム0.05%溶液を布片で塗布・清拭するか、または噴霧する。</td> </tr> <tr> <td>腫瘍の洗浄</td> <td>塩化ベンゼトニウム0.025%溶液を用いる。</td> </tr> <tr> <td>結膜囊の洗浄・消毒</td> <td>塩化ベンゼトニウム0.02%溶液を用いる。</td> </tr> </tbody> </table>	効能・効果	用法・用量	手指・皮膚の消毒	通常石けんで十分に洗浄し、水で石けん分を十分に洗い流した後、塩化ベンゼトニウム0.05~0.1%溶液に浸して洗い、滅菌ガーゼあるいは布片で清拭する。術前の手洗の場合には、5~10分間ブラッシングする。	手術部位(手術野)の皮膚の消毒	塩化ベンゼトニウム0.01~0.025%溶液を用いる。	感染皮膚面の消毒	塩化ベンゼトニウム0.01%溶液を用いる。	手術室・病室・家具・器具・物品などの消毒	塩化ベンゼトニウム0.05%溶液を布片で塗布・清拭するか、または噴霧する。	腫瘍の洗浄	塩化ベンゼトニウム0.025%溶液を用いる。	結膜囊の洗浄・消毒	塩化ベンゼトニウム0.02%溶液を用いる。	<table border="1"> <thead> <tr> <th>効能・効果</th> <th>用法・用量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>手指・皮膚の消毒</td> <td>通常石けんで十分に洗浄し、水で石けん分を十分に洗い流した後、塩化ベンゼトニウム0.05~0.1%溶液に浸して洗い、滅菌ガーゼあるいは布片で清拭する。術前の手洗の場合には、5~10分間ブラッシングする。</td> </tr> <tr> <td>手術部位(手術野)の皮膚の消毒</td> <td>手術前所皮膚面を、塩化ベンゼトニウム0.1%溶液で約5分間洗い、その後塩化ベンゼトニウム0.2%溶液を塗布する。</td> </tr> <tr> <td>手術部位(手術野)の結核の消毒、皮膚・粘膜の創傷部位の消毒</td> <td>塩化ベンゼトニウム0.01~0.02%溶液を用いる。</td> </tr> <tr> <td>感染皮膚面の消毒</td> <td>塩化ベンゼトニウム0.01%溶液を用いる。</td> </tr> <tr> <td>医療用具の消毒</td> <td>塩化ベンゼトニウム0.1%溶液に10分間浸漬するか、または密閉消毒する際には、器具を予め2%次亜酸化ナトリウム水溶液で洗い、その後塩化ベンゼトニウム0.1%溶液中で15分間煮沸する。</td> </tr> <tr> <td>手術室・病室・家具・器具・物品などの消毒</td> <td>塩化ベンゼトニウム0.05~0.1%溶液を布片で塗布・清拭するか、または噴霧する。</td> </tr> <tr> <td>腫瘍の洗浄</td> <td>塩化ベンゼトニウム0.025%溶液を用いる。</td> </tr> <tr> <td>結膜囊の洗浄・消毒</td> <td>塩化ベンゼトニウム0.02%溶液を用いる。</td> </tr> </tbody> </table>	効能・効果	用法・用量	手指・皮膚の消毒	通常石けんで十分に洗浄し、水で石けん分を十分に洗い流した後、塩化ベンゼトニウム0.05~0.1%溶液に浸して洗い、滅菌ガーゼあるいは布片で清拭する。術前の手洗の場合には、5~10分間ブラッシングする。	手術部位(手術野)の皮膚の消毒	手術前所皮膚面を、塩化ベンゼトニウム0.1%溶液で約5分間洗い、その後塩化ベンゼトニウム0.2%溶液を塗布する。	手術部位(手術野)の結核の消毒、皮膚・粘膜の創傷部位の消毒	塩化ベンゼトニウム0.01~0.02%溶液を用いる。	感染皮膚面の消毒	塩化ベンゼトニウム0.01%溶液を用いる。	医療用具の消毒	塩化ベンゼトニウム0.1%溶液に10分間浸漬するか、または密閉消毒する際には、器具を予め2%次亜酸化ナトリウム水溶液で洗い、その後塩化ベンゼトニウム0.1%溶液中で15分間煮沸する。	手術室・病室・家具・器具・物品などの消毒	塩化ベンゼトニウム0.05~0.1%溶液を布片で塗布・清拭するか、または噴霧する。	腫瘍の洗浄	塩化ベンゼトニウム0.025%溶液を用いる。	結膜囊の洗浄・消毒	塩化ベンゼトニウム0.02%溶液を用いる。	<table border="1"> <thead> <tr> <th>効能・効果</th> <th>用法・用量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>手指・皮膚の消毒</td> <td>通常石けんで十分に洗浄し、水で石けん分を十分に洗い流した後、塩化ベンゼトニウム0.05~0.1%溶液に浸して洗い、滅菌ガーゼあるいは布片で清拭する。術前の手洗の場合には、5~10分間ブラッシングする。</td> </tr> <tr> <td>手術部位(手術野)の皮膚の消毒</td> <td>手術前所皮膚面を、塩化ベンゼトニウム0.1%溶液で約5分間洗い、その後塩化ベンゼトニウム0.2%溶液を塗布する。</td> </tr> <tr> <td>手術部位(手術野)の結核の消毒、皮膚・粘膜の創傷部位の消毒</td> <td>塩化ベンゼトニウム0.01~0.02%溶液を用いる。</td> </tr> <tr> <td>感染皮膚面の消毒</td> <td>塩化ベンゼトニウム0.01%溶液を用いる。</td> </tr> <tr> <td>医療用具の消毒</td> <td>塩化ベンゼトニウム0.1%溶液に10分間浸漬するか、または密閉消毒する際には、器具を予め2%次亜酸化ナトリウム水溶液で洗い、その後塩化ベンゼトニウム0.1%溶液中で15分間煮沸する。</td> </tr> <tr> <td>手術室・病室・家具・器具・物品などの消毒</td> <td>塩化ベンゼトニウム0.05~0.1%溶液を布片で塗布・清拭するか、または噴霧する。</td> </tr> <tr> <td>腫瘍の洗浄</td> <td>塩化ベンゼトニウム0.025%溶液を用いる。</td> </tr> <tr> <td>結膜囊の洗浄・消毒</td> <td>塩化ベンゼトニウム0.02%溶液を用いる。</td> </tr> </tbody> </table>	効能・効果	用法・用量	手指・皮膚の消毒	通常石けんで十分に洗浄し、水で石けん分を十分に洗い流した後、塩化ベンゼトニウム0.05~0.1%溶液に浸して洗い、滅菌ガーゼあるいは布片で清拭する。術前の手洗の場合には、5~10分間ブラッシングする。	手術部位(手術野)の皮膚の消毒	手術前所皮膚面を、塩化ベンゼトニウム0.1%溶液で約5分間洗い、その後塩化ベンゼトニウム0.2%溶液を塗布する。	手術部位(手術野)の結核の消毒、皮膚・粘膜の創傷部位の消毒	塩化ベンゼトニウム0.01~0.02%溶液を用いる。	感染皮膚面の消毒	塩化ベンゼトニウム0.01%溶液を用いる。	医療用具の消毒	塩化ベンゼトニウム0.1%溶液に10分間浸漬するか、または密閉消毒する際には、器具を予め2%次亜酸化ナトリウム水溶液で洗い、その後塩化ベンゼトニウム0.1%溶液中で15分間煮沸する。	手術室・病室・家具・器具・物品などの消毒	塩化ベンゼトニウム0.05~0.1%溶液を布片で塗布・清拭するか、または噴霧する。	腫瘍の洗浄	塩化ベンゼトニウム0.025%溶液を用いる。	結膜囊の洗浄・消毒	塩化ベンゼトニウム0.02%溶液を用いる。
	効能・効果	用法・用量																																																																							
手術部位(手術野)の皮膚の消毒	塩化ベンゼトニウム0.01~0.02%溶液を用いる。																																																																								
腫瘍の洗浄	塩化ベンゼトニウム0.01%溶液を用いる。																																																																								
結膜囊の洗浄・消毒	塩化ベンゼトニウム0.02%溶液を用いる。																																																																								
効能・効果	用法・用量																																																																								
手術部位(手術野)の皮膚の消毒	塩化ベンゼトニウム0.01~0.025%溶液を用いる。																																																																								
感染皮膚面の消毒	塩化ベンゼトニウム0.01%溶液を用いる。																																																																								
腫瘍の洗浄	塩化ベンゼトニウム0.025%溶液を用いる。																																																																								
結膜囊の洗浄・消毒	塩化ベンゼトニウム0.02%溶液を用いる。																																																																								
効能・効果	用法・用量																																																																								
手指・皮膚の消毒	通常石けんで十分に洗浄し、水で石けん分を十分に洗い流した後、塩化ベンゼトニウム0.05~0.1%溶液に浸して洗い、滅菌ガーゼあるいは布片で清拭する。術前の手洗の場合には、5~10分間ブラッシングする。																																																																								
手術部位(手術野)の皮膚の消毒	塩化ベンゼトニウム0.01~0.025%溶液を用いる。																																																																								
感染皮膚面の消毒	塩化ベンゼトニウム0.01%溶液を用いる。																																																																								
手術室・病室・家具・器具・物品などの消毒	塩化ベンゼトニウム0.05%溶液を布片で塗布・清拭するか、または噴霧する。																																																																								
腫瘍の洗浄	塩化ベンゼトニウム0.025%溶液を用いる。																																																																								
結膜囊の洗浄・消毒	塩化ベンゼトニウム0.02%溶液を用いる。																																																																								
効能・効果	用法・用量																																																																								
手指・皮膚の消毒	通常石けんで十分に洗浄し、水で石けん分を十分に洗い流した後、塩化ベンゼトニウム0.05~0.1%溶液に浸して洗い、滅菌ガーゼあるいは布片で清拭する。術前の手洗の場合には、5~10分間ブラッシングする。																																																																								
手術部位(手術野)の皮膚の消毒	手術前所皮膚面を、塩化ベンゼトニウム0.1%溶液で約5分間洗い、その後塩化ベンゼトニウム0.2%溶液を塗布する。																																																																								
手術部位(手術野)の結核の消毒、皮膚・粘膜の創傷部位の消毒	塩化ベンゼトニウム0.01~0.02%溶液を用いる。																																																																								
感染皮膚面の消毒	塩化ベンゼトニウム0.01%溶液を用いる。																																																																								
医療用具の消毒	塩化ベンゼトニウム0.1%溶液に10分間浸漬するか、または密閉消毒する際には、器具を予め2%次亜酸化ナトリウム水溶液で洗い、その後塩化ベンゼトニウム0.1%溶液中で15分間煮沸する。																																																																								
手術室・病室・家具・器具・物品などの消毒	塩化ベンゼトニウム0.05~0.1%溶液を布片で塗布・清拭するか、または噴霧する。																																																																								
腫瘍の洗浄	塩化ベンゼトニウム0.025%溶液を用いる。																																																																								
結膜囊の洗浄・消毒	塩化ベンゼトニウム0.02%溶液を用いる。																																																																								
効能・効果	用法・用量																																																																								
手指・皮膚の消毒	通常石けんで十分に洗浄し、水で石けん分を十分に洗い流した後、塩化ベンゼトニウム0.05~0.1%溶液に浸して洗い、滅菌ガーゼあるいは布片で清拭する。術前の手洗の場合には、5~10分間ブラッシングする。																																																																								
手術部位(手術野)の皮膚の消毒	手術前所皮膚面を、塩化ベンゼトニウム0.1%溶液で約5分間洗い、その後塩化ベンゼトニウム0.2%溶液を塗布する。																																																																								
手術部位(手術野)の結核の消毒、皮膚・粘膜の創傷部位の消毒	塩化ベンゼトニウム0.01~0.02%溶液を用いる。																																																																								
感染皮膚面の消毒	塩化ベンゼトニウム0.01%溶液を用いる。																																																																								
医療用具の消毒	塩化ベンゼトニウム0.1%溶液に10分間浸漬するか、または密閉消毒する際には、器具を予め2%次亜酸化ナトリウム水溶液で洗い、その後塩化ベンゼトニウム0.1%溶液中で15分間煮沸する。																																																																								
手術室・病室・家具・器具・物品などの消毒	塩化ベンゼトニウム0.05~0.1%溶液を布片で塗布・清拭するか、または噴霧する。																																																																								
腫瘍の洗浄	塩化ベンゼトニウム0.025%溶液を用いる。																																																																								
結膜囊の洗浄・消毒	塩化ベンゼトニウム0.02%溶液を用いる。																																																																								
使用上の注意	<p>(1)副作用(まれに：0.1%未満、ときに：0.1~5%未満、副詞なし：5%以上又は頻度不明) 過敏症：発疹、痒疹等の過敏症状があらわれることがあるので、このような場合には使用を中止すること。</p> <p>(2)臨床検査値への影響 本剤で消毒したカテーテルで採取した尿はスルホサリチル酸法による尿蛋白試験で偽陰性を示すことがある。</p> <p>(3)適用上の注意 1)人体 ア.経口投与しないこと。 イ.原液が眼に入らないように注意すること。入った場合には水でよく洗い流すこと。 ウ.濃厚液の使用により、皮膚・粘膜の刺激症状があらわれることがあるので、注意すること。 エ.炎症又は易刺激性の部位に使用する場合には、正常の部位に使用するよりも低濃度とすることが望ましい。 オ.粘膜、創傷面又は炎症部位に長期間又は広範囲に使用しないこと(全身吸収による筋力低下を引き起こすおそれがある)。 カ.密封包装、キップ包装、パックに使用すると刺激症状があらわれることがあるので、使用しないことが望ましい。 キ.深い創傷又は眼に使用する場合は希釈液としては、精製水を用い、調整後滅菌処理すること。</p> <p>2)その他 ア.血清、膿汁等の有機性物質は殺菌作用を減弱させるので、これらが付着している場合は、十分に洗い落してから使用すること。 イ.石けん類は本剤の殺菌作用を弱めるので、石けん分を洗い落してから使用すること。 ウ.希釈溶液を調整する場合は、精製水を使用して滅菌することが望ましい。 エ.繊維、布(綿、ガーゼ、ウール、レーヨン等)は塩化ベンゼトニウムを吸着するので、これらを溶液に浸漬して使用する場合には、有効濃度以下とならないように新しい溶液を補充すること。 オ.皮膚消毒に使用する綿球、ガーゼ等は滅菌保存し、使用時に溶液に浸すこと。</p>																																																																								
薬効薬理	芽胞のない細菌、真菌類に広く抗菌力を有し、グラム陽性菌には陰性菌より低濃度で効果を示す。一方、結核菌及び大部分のウイルスに対する殺菌効果は期待できない。																																																																								
性状	本品は無色透明の液で、においはない。滅菌製剤である。																																																																								
取扱い上の注意	<p>〔貯法〕 遮光した気密容器に保存。〔使用期限〕 製造の翌月より3年。表示の使用期限に注意すること。</p> <p>〔注意〕 (1)開封時及び開封後は、微生物による汚染に注意すること。 (2)皮革製品の消毒に使用すると、変質させることがあるので使用しないこと。</p>																																																																								
包装	500mL	500mL、1000mL、5L	500mL、	500mL、	500mL																																																																				
文献請求先	健栄製薬株式会社 学術部 〒541 大阪市中央区伏見町2丁目5番8号																																																																								

[詳細は添付文書等をご参照ください。]