


指定医薬部外品

非危険物のすり込み式手指消毒剤

手ピカ[®] スプレー —マイルド—



企業や医療機関の
感染対策に…



近年、インフルエンザを初めとする感染症の流行に伴い、事業者・職場等における感染防止対策の一環として、すり込み式手指消毒剤が使用されるケースが増えています。しかし、高濃度のエタノールを含有する製品は、消防法上の危険物に該当し、一般倉庫等で大量に保管することが困難な場合があります。

手ピカスプレーマイルドは、消防法の規制を受けない非危険物のすり込み式手指消毒剤で、有効成分としてベンザルコニウム塩化物を0.05 w/v%含有し、湿潤剤として尿素やグリセリン等を添加したエタノール溶液です。

特性

1. 非危険物のため、消防法で定める保管時の指定数量に制限がなく、保管場所を選びません。
2. インフルエンザウイルスや黄色ブドウ球菌、大腸菌などに迅速な抗微生物効果を示します。
3. 湿潤剤としてグリセリン、尿素等を配合し、手荒れ防止に配慮しています。

組成性状

有効成分	100 mL中 ベンザルコニウム塩化物 0.05 g含有
添加物	アラントイン、グリセリン、尿素、エタノール
性状	無色透明の液です。

効能効果、用法用量

● 効能効果

手指・皮膚の洗浄・消毒

● 用法用量

適量を手指にとり、塗布又は塗擦してください。

消毒効果 (in vitro 試験)

黄色ブドウ球菌及び大腸菌に対し、手ピカスプレーマイルドの in vitro における消毒効果について試験した結果、いずれの供試菌に対しても 15 秒以内で消毒し、優れた消毒効果が確認されました。

供試菌株	消毒時間 *1
Staphylococcus aureus IFO 12732 (黄色ブドウ球菌)	≤ 15 秒間
Escherichia coli IFO 3806 (大腸菌)	≤ 15 秒間

*1 : 99.999%以上の減少に要した時間

● 健栄製薬株式会社 社内資料：手ピカスプレーマイルドの抗微生物効果について

ウイルス不活化効果 (in vitro 試験)

4種のウイルス [A型インフルエンザウイルス (H1N1)、A型インフルエンザウイルス (H1N1) pdm 09、B型インフルエンザウイルス、低病原性鳥インフルエンザウイルス (H5N9)] に対し、手ピカスプレーマイルドの in vitro におけるウイルス不活化効果について試験した結果、いずれの供試ウイルスに対しても 10 秒以内で不活化効果が確認されました。

供試ウイルス	ウイルス不活化時間 *2
A型インフルエンザウイルス (H1N1)	≤ 10 秒間
A型インフルエンザウイルス (H1N1) pdm 09	≤ 10 秒間
B型インフルエンザウイルス	≤ 10 秒間
低病原性鳥インフルエンザウイルス (H5N9)	≤ 10 秒間

*2 : 99.9%以上の不活化に要した時間

● 健栄製薬株式会社 社内資料：手ピカスプレーマイルドの抗微生物効果について

手指消毒法

1

手ピカスプレーマイルド
約 3 mL (ポンプひと押し分)
を手のひらにとります。



2



初めに両手の指先 (爪) に手ピカスプレーマイルドをよくすり込みます。

3



次に手のひらによくすり込みます。

4



手の甲にもすり込みます。

5



指の間にもすり込みます。

6



親指にもすり込みます。

7



手首にも十分すり込みます。手ピカスプレーマイルドが乾燥するまでよくすり込みます。

包装

1000 mL

優れた使用性



- 使用時に、付属の手押し式スプレーポンプを装着します。

減容ボトル採用によりゴミ削減



- 折りたたみが容易な角型減容ボトルを採用していますので、使用後のゴミを減らし、廃棄処理コストが削減できます。減容後の容積は約1/4になります。

手ピカ[®] スプレーマイルド の INFORMATION

商品名	和名	手ピカ [®] スプレーマイルド						
	洋名	TEPIKA SPRAY MILD						
製造販売元	健栄製薬株式会社	区分	指定医薬部外品					
分類	すり込み式手指消毒剤	承認番号	22200DZX01171					
販売開始年月	2012年3月	承認年月	2010年8月					
成分	有効成分	100 mL中 ベンザルコニウム塩化物 0.05g含有						
	添加物	アラントイン、グリセリン、尿素、エタノール						
	性状	無色透明の液です。						
効能効果	手指・皮膚の洗浄・消毒							
用法用量	適量を手指にとり、塗布又は塗擦してください。							
	<p>〈用法用量に関連する注意〉</p> <p>(1)用法用量を厳守してください。</p> <p>(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。</p> <p>(3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。</p> <p>(4)外用にのみ使用してください。</p> <p>(5)血液や汚物等が付着している場合には、石けんでよく洗浄後、使用してください。</p>							
使用上の注意	<p>してはいけないこと</p> <p>(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)</p> <p>次の人は使用しないでください</p> <p>(1)患部が広範囲の人。(2)深い傷やひどいやけどの人。</p> <p>相談すること</p> <p>1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください</p> <p>(1)医師の治療を受けている人。</p> <p>(2)本人又は家族がアレルギー体質の人。</p> <p>(3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> <p>2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談してください</p> <p>使用後、次の症状があらわれた場合</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>関係部位</th> <th>症状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>皮膚</td> <td>発疹・発赤、かゆみ</td> </tr> </tbody> </table>				関係部位	症状	皮膚	発疹・発赤、かゆみ
	関係部位	症状						
皮膚	発疹・発赤、かゆみ							
保管及び取扱い上の注意	<p>〈貯法〉気密容器。火気を避けて室温保存。</p> <p>(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。</p> <p>(2)小児の手の届かない所に保管してください。</p> <p>(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)</p> <p>(4)火気に近づけないでください。</p> <p>(5)開封時、容器の肩部又は底部をもち、液がとびださないように、キャップを開けてください。</p> <p>(6)薬剤が床や家具等に付着しないようにしてください。(変質又は変色のおそれがあります。)</p>							
	包装	1000 mL						

[詳細は製品容器等をご参照ください。]

資料請求・お問い合わせ先

健栄製薬株式会社 学術情報部
 〒541-0044 大阪市中央区伏見町2丁目5番8号 電話番号 06(6231)5626 FAX番号 06(6204)0750