

単包装の消毒剤含浸綿棒シリーズ

外用殺菌消毒剤

滅菌製剤


ステリクロン[®]0.05%綿棒16

0.05%クロルヘキシジングルコン酸塩液含浸綿棒

STERICLON[®] 0.05% COTTON SWAB 16

滅菌済・単包装の消毒剤含浸綿棒製剤なので、

1. 調製の手間や鑷子等の準備が不要で、業務の省力化が可能です。
2. 微生物汚染の心配がなく、衛生的です。
3. 開封後直ちに使用でき、在宅医療等にも適しています。
4. フィルムの開封や薬液の塗布が容易で、使用性に優れています。



ステリクロン[®]0.05%綿棒16

STERICLON[®] 0.05% COTTON SWAB 16

クロルヘキシジングルコン酸塩は、グラム陽性菌、グラム陰性菌等に対し、広範囲に抗微生物スペクトルを有するピグアナイド系の殺菌消毒剤で、その0.05 w/v%液を含ませた綿球や綿棒は、院内において皮膚の創傷部位の消毒等に広く用いられています。

しかし、院内で調製する際には、消毒剤・滅菌綿球・滅菌綿棒の準備、万能壺・鑷子の洗浄・滅菌等の手間や経費がかかり、また、調製後は微生物汚染に十分に注意し、使用期限を管理する必要があります。

ステリクロン0.05%綿棒16は、0.05 w/v%クロルヘキシジングルコン酸塩液を綿棒に含浸させ、蒸気滅菌した単包装の綿棒製剤なので、調製の手間を省き、簡単かつ衛生的に使用できます。

特性

1

業務の省力化

消毒剤・滅菌綿球・滅菌綿棒の準備、万能壺・鑷子の洗浄・滅菌等が不要なので、業務の省力化が可能です。

2

滅菌済

開封前の無菌を保証した滅菌製剤なので、微生物汚染による感染の心配がありません。

3

衛生的

単包装の使い切りなので、消毒剤や綿球・綿棒の継ぎ足し等の不衛生な使用を防止し、衛生的に使用することができます。また、調製後の使用期限等の管理も不要です。

4

簡単

開封後直ちに使用することができます。また、携帯にも便利で、いつでも、どこでも手軽に使用でき、往診、訪問看護や在宅医療にも適しています。

5

経済的

使い残しがなく、消毒剤や綿球・綿棒の無駄な消費をなくすることができます。

ステリクロン0.05%綿棒16には、様々な工夫が施されています……

1

持手タブ

フィルムの開封を容易にするため、開封口には持手タブを設けています。

2

太い軸

適度な柔軟性のある太軸の綿棒を用いています。

3


毛羽立ちの少ない脱脂綿

消毒部位の繊維残留を抑えるため、毛羽立ちの少ない脱脂綿を用いています。

4

厚みのあるトレー

脱脂綿部の型崩れを防ぐため、厚みのあるトレーを用いています。



開封の方法

● 1本ずつ開封する場合



トレー1本をミシン目より切りはなします。タブを持ち、フィルムをはぎ取ります。


● 2本まとめて開封する場合



トレー2本分のタブを持ち、フィルムをまとめてはぎ取ります。

皮膚消毒効果 (in vivo試験)


各種細菌で汚染させた皮膚に対するステリクロン0.05%綿棒16の消毒効果を試験した結果、滅菌精製水含浸綿棒による平均減菌率は60～80%程度であったのに対し、ステリクロン0.05%綿棒16はいずれの細菌に対しても、90%以上の平均減菌率を示し、優れた消毒効果が確認されました¹⁾。



成分

# 16 綿棒	綿棒 1本あたり 0.05 w/v% クロルヘキシジングルコン酸塩液 4.6 mL 含浸
---------	---

綿棒の大きさ **実物大**



効能効果、用法用量

- 効能効果
すり傷、きり傷、かき傷、さし傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒
- 用法用量
1日数回患部に塗布してください。

包装

16 綿棒 × 1本 × 56 (2連 × 28)

ステリクロン® 0.05%綿棒 16の DRUG INFORMATION

商品名	和名	ステリクロン® 0.05%綿棒 16						
	洋名	STERICLON® 0.05% COTTON SWAB 16						
製造販売元	健栄製薬株式会社							
日本標準商品分類番号	872619	承認番号	22400 APX 00376					
薬効分類	外用殺菌消毒剤	承認年月	2012年8月					
区分	第2類医薬品	販売開始年月	2012年9月					
使用上の注意	<p>〔相談すること〕</p> <p>1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください</p> <p>(1) 医師の治療を受けている人。</p> <p>(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> <p>(3) 患部が広範囲の人。</p> <p>(4) 深い傷やひどいやけどの人。</p> <p>2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、添付文書等を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>関係部位</th> <th>症状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>皮膚</td> <td>発疹・発赤、かゆみ</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、添付文書等を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください</p>				関係部位	症状	皮膚	発疹・発赤、かゆみ
関係部位	症状							
皮膚	発疹・発赤、かゆみ							
効能効果	すり傷、きり傷、かき傷、さし傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒							
用法用量	<p>1 日数回患部に塗布してください。</p> <p>〈用法用量に関連する注意〉</p> <p>(1) 用法用量を厳守してください。</p> <p>(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。</p> <p>(3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。</p> <p>(4) 石けん類は本剤の殺菌作用を弱めるので、石けん分を洗い流してから使用してください。</p> <p>(5) 外用にのみ使用してください。</p>							
成分	<table border="1"> <tr> <td># 16 綿棒</td> <td>綿棒 1本あたり 0.05 w/v% クロルヘキシジングルコン酸塩液 4.6 mL 含浸</td> </tr> </table>				# 16 綿棒	綿棒 1本あたり 0.05 w/v% クロルヘキシジングルコン酸塩液 4.6 mL 含浸		
# 16 綿棒	綿棒 1本あたり 0.05 w/v% クロルヘキシジングルコン酸塩液 4.6 mL 含浸							
保管及び取扱い上の注意	<p>〈貯法〉 気密容器・室温保存</p> <p>〈使用期限〉 容器等に表示</p> <p>(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。</p> <p>(2) 小児の手の届かない所に保管してください。</p> <p>(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)</p> <p>(4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。</p> <p>(5) 開封時及び開封後は、微生物による汚染に注意してください。脱脂綿部に指が触れないよう注意してください。</p> <p>(6) 開封後は速やかに使用してください。</p> <p>(7) 綿の表面又は内部にある小さなしみのような黒又は黄色の斑点状のものは、ワタの種子です。(変質したものではありません。)</p>							
包装	# 16 綿棒 × 1本 × 56 (2連 × 28)							

[詳細は添付文書等をご参照ください。]

主要文献

1) 健栄製薬株式会社 社内資料：ステリクロン0.05%綿棒 16の皮膚消毒効果について

文献請求先

主要文献に記載の社内資料につきましても下記にご請求下さい。

健栄製薬株式会社 学術情報部

〒541-0044 大阪市中央区伏見町2丁目5番8号 電話番号 06(6231)5626 FAX番号 06(6204)0750