

手指・皮膚及び医療機器の消毒に…

殺菌消毒剤

日本薬局方

エタノール

Ethanol

日本薬局方

無水エタノール

Anhydrous Ethanol



■ 組成・性状

エタノール

エタノール (C_2H_6O) 95.1～96.9 vol%を含有する。
無色透明の液である。

無水エタノール

エタノール (C_2H_6O) 99.5 vol%以上を含有する。
無色透明の液である。

■ 効能・効果（エタノール・無水エタノール共通）

手指・皮膚の消毒、手術部位（手術野）の皮膚の消毒、医療機器の消毒

〔禁忌（次の部位には使用しないこと）〕

●損傷皮膚及び粘膜

〔注意〕

●原液又は濃厚液は刺激作用があるので経口投与しないこと。 [要約]

詳細は、D.I. 欄又は製品添付文書等をご参照ください。

2015年11月作成

■ 用法・用量

エタノール

本品830mLを精製水でうすめて1000mLとし、これを消毒部位に塗布する。

無水エタノール

本品を精製水でうすめて、エタノールとして76.9～81.4 vol%とし、これを消毒部位に塗布する。

■ 包装

エタノール

500 mL (ポリエチ瓶)、500 mL (ガラス瓶)、16 L

無水エタノール

500 mL (ポリエチ瓶)、500 mL (ガラス瓶)、16 L

DRUG INFORMATION

「禁忌を含む使用上の注意」の改訂に十分ご留意ください。

商品名 洋名	日本薬局方 エタノール		
製造販売元	健栄製薬株式会社		
日本標準商品分類番号	872615	承認番号	(61AM)1531
葉効分類	殺菌消毒剤	承認年月	1986年3月
規制区分	普通薬	薬価基準収載年月	1986年3月
販売開始年月	1994年11月	再評価結果	1982年8月
禁忌	禁忌 (次の部位には使用しないこと) 損傷皮膚及び粘膜 [損傷皮膚及び粘膜への使用により、刺激作用を有する。]		
組成・性状	エタノール (C_2H_5O) 95.1 ~ 96.9 vol%を含有する。 無色透明の液である。		
効能・効果	手指・皮膚の消毒、手術部位 (手術野) の皮膚の消毒、医療機器の消毒		
用法・用量	本品830mLを精製水でうすめて1000mLとし、これを消毒部位に塗布する。		
使用上の注意 〔使用上の注意の改訂に十分留意すること。〕	<p>1. 重要な基本的注意 (1) 眼に入らないように注意すること。 眼に入った場合には水でよく洗い流すこと。 (2) 広範囲又は長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。</p> <p>2. 副作用 本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。 (1) 過敏症：発疹等の過敏症状（頻度不明）があらわれることがあるので、このような場合には使用を中止し、適切な処置を行うこと。 (2) 皮膚：刺激症状（頻度不明）があらわれることがあるので、このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。</p> <p>3. 適用上の注意 (1) 人体 1) 投与経路：原液又は濃厚液は刺激作用があるので経口投与しないこと。 2) 使用時：同一部位（皮膚面）に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので、注意すること。</p>	<p>(2) その他 1) 使用時：血清、膿汁等の蛋白質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療器具等に用いる場合には、十分に洗い落としてから使用すること。 2) 器具等材質： ア. 合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具、鏡器具、塗装カーテル等には、変質するものがあるので、このような器具は長時間浸漬しないこと。 イ. 金属器具を長時間浸漬する必要がある場合には、腐蝕を防止するために0.2 ~ 1.0%の亜硝酸ナトリウムを添加すること。</p>	
葉効薬理	本剤は、使用濃度において栄養型細菌（グラム陽性菌、グラム陰性菌）、酵母菌、ウイルス等には有効であるが、芽胞（炭疽菌、破傷風菌等）及び一部のウイルスに対する効果は期待できない。		
取扱い上の注意	〈貯 法〉 気密容器・遮光して、火気を避けて室温保存 〈使用期限〉 容器等に表示 〈注 意〉 (1) 引火性、爆発性があるため、火気（電気メス使用等も含む）には十分注意すること。 (2) 衣類等につくと脱色、変色があるので注意すること。		
包装	500mL (ポリエチレン瓶)、500mL (ガラス瓶)、16L		[詳細は添付文書等をご参照ください。]

DRUG INFORMATION

「禁忌を含む使用上の注意」の改訂に十分ご留意ください。

商品名 洋名	日本薬局方 無水エタノール		
製造販売元	Anhydrous Ethanol	丸石製薬株式会社	
日本標準商品分類番号	872615		
葉効分類	殺菌消毒剤		
規制区分	普通薬		
承認番号	(61AM)1532	16100AMZ00994	
承認年月	1986年3月	1986年2月	
薬価基準収載年月	1986年3月	1956年3月	
販売開始年月	1994年11月	2010年8月	
再評価結果	1982年8月		
禁忌	禁忌 (次の部位には使用しないこと) 損傷皮膚及び粘膜 [損傷皮膚及び粘膜への使用により、刺激作用を有する。]		
組成・性状	エタノール (C_2H_5O) 99.5 vol%以上を含有する。 無色透明の液である。		
効能・効果	手指・皮膚の消毒、手術部位 (手術野) の皮膚の消毒、医療機器の消毒		
用法・用量	本品を精製水でうすめて、エタノールとして76.9 ~ 81.4 vol%とし、これを消毒部位に塗布する。		
使用上の注意 〔使用上の注意の改訂に十分留意すること。〕	<p>1. 重要な基本的注意 (1) 眼に入らないように注意すること。 眼に入った場合には水でよく洗い流すこと。 (2) 広範囲又は長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。</p> <p>2. 副作用 本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。 (1) 過敏症：発疹等の過敏症状（頻度不明）があらわれることがあるので、このような場合には使用を中止し、適切な処置を行うこと。 (2) 皮膚：刺激症状（頻度不明）があらわれることがあるので、このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。</p> <p>3. 適用上の注意 (1) 人体 1) 投与経路：原液又は濃厚液は刺激作用があるので経口投与しないこと。 2) 使用時：同一部位（皮膚面）に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので、注意すること。 (2) その他 1) 使用時：血清、膿汁等の蛋白質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療器具等に用いる場合には、十分に洗い落としてから使用すること。 2) 器具等材質： ア. 合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具、鏡器具、塗装カーテル等には、変質するものがあるので、このような器具は長時間浸漬しないこと。 イ. 金属器具を長時間浸漬する必要がある場合には、腐蝕を防止するために0.2 ~ 1.0%の亜硝酸ナトリウムを添加すること。</p> <p>4. その他の注意 承認外の経皮的エタノール注入療法 (PEIT) 使用例で、注入時の疼痛、酩酊感、発熱、本剤の局所外流出による重篤な胆道・腹腔内等での出血、肝梗塞、肝不全等が報告されている。</p>	<p>1. 重要な基本的注意 (1) 本剤が眼に入らないように注意すること。 眼に入った場合は直ちによく水洗すること。 (2) 広範囲又は長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。 [エタノール蒸気に大量に又は繰り返しざらされた場合、粘膜への刺激、頭痛等を起こすことがある。]</p> <p>2. 副作用 本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。 (1) 過敏症 (注) 発疹等 (2) 皮膚 (注) 刺激症状</p> <p>(注) このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。</p>	
葉効薬理	本剤は、使用濃度において栄養型細菌（グラム陽性菌、グラム陰性菌）、酵母菌、ウイルス等には有効であるが、芽胞（炭疽菌、破傷風菌等）及び一部のウイルスに対する効果は期待できない。		
取扱い上の注意	〈貯 法〉 気密容器・遮光して、火気を避けて室温保存 〈使用期限〉 容器等に表示 〈注 意〉 (1) 引火性、爆発性があるため、火気（電気メス使用等も含む）には十分注意すること。 (2) 衣類等につくと脱色、変色があるので注意すること。		
包装	500mL (ガラス瓶)、16L	500mL (ポリエチレン瓶)	[詳細は添付文書等をご参照ください。]

文献請求先

健栄製薬株式会社 学術情報部
〒541-0044 大阪市中央区伏見町2丁目5番8号 電話番号 06(6231)5626 FAX番号 06(6204)0750

[詳細は添付文書等をご参照ください。]