

※ 2008年1月改訂(第2版)
2005年8月作成

外皮消毒剤

滅菌製剤

承認番号	(17D)1166
承認年月	2005年6月
販売開始	2005年9月

指定医薬部外品

ザルコニン[®]0.025%綿球C

※(0.025%ベンザルコニウム塩化物液含浸綿球)

ZALKONIN[®] 0.025% COTTON BALL C

貯法：気密容器・室温保存
使用期限：容器等に表示

△ 使用上の注意

【してはいけないこと】☒

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は使用しないでください

- (1) 患部が広範囲の人。
- (2) 深い傷やひどいやけどの人。

【相談すること】☒

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

(2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

【効 能 効 果】 すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒

【用 法 用 量】 1日数回患部に塗布してください。

〈用法用量に関連する注意〉

- (1) 用法用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 綿球を患部に貼付しないでください。
- (5) 石けん類は本剤の殺菌作用を弱めるので、石けん分を洗い流してから使用してください。
- (6) 外用にのみ使用し、内服しないでください。

※【成 分】

#20 綿球	綿球1球(脱脂綿0.44g)あたり 0.025w/v%ベンザルコニウム塩化物液4.4mL含浸
--------	---

【保管及び取扱 上の注意】 (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)

(4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

(5) 開封時及び開封後は、微生物による汚染に注意してください。

綿球は清潔なピンセット等を用いて使用し、綿球に指が触れないよう注意してください。

(6) 開封後は速やかに使用してください。

(7) 綿の表面又は内部にある小さなしみのような黒又は黄色の斑点状のものは、ワタの種子です。(変質したものではありません。)

【包 装】 #20 綿球×1球×90 (6連球×15)