ラビジェルA

■最初に使用する時に



キャップ①を固定し、ポンプカバー②を矢印の方向に回すと、ポンプが上がります。液が出るまで数回押してください。

■手指消毒法

①適量を手のひらに取ります。

②手指全体にすり込むよう伸ばし、乾燥するまで、よくすり込みます。

折りたたんで廃棄しやすいボトルを採用

プラ

ポンプ：PP,PE
ポンプカバー：PP
ボトル：PE
ラベル：PE
外装フィルム：PE

折り目

目安
400
300
200
100

開封日

年　月　日

指定医薬部外品

とりかえの目安

年　月　日

速乾性すり込み式手指消毒剤

ラビジェルA®

アルコール類＊水溶性＊危険等級Ⅱ

RABIGEL® A

500mL

火気厳禁

貯法：気密容器
火気を避けて
室温保存

ケンエー
健栄製薬株式会社
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号　06(6231)5626

ラビジェルA

指定医薬部外品　販売名：手指消毒用ジェルV1

使用に際しては、説明書きをよく読んでください

⚠使用上の注意

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

次の人は使用しないでください

(1)患部が広範囲の人。
(2)深い傷やひどいやけどの人。

相談すること

1．次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

(1)医師の治療を受けている人。
(2)本人又は家族がアレルギー体質の人。
(3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2．次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談してください

使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症　状
皮　ふ	発疹・発赤、かゆみ

〔効能効果〕

手指・皮膚の洗浄・消毒

〔用法用量〕

適量を手指にとり、塗布又は塗擦してください。

〈用法用量に関連する注意〉

(1)用法用量を厳守してください。
(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

（右側面へ続く↗）

見本 80%

4 987286 200156

折り目

ラビジェルA

B

（↖左側面より続く）

(3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
(4)外用にのみ使用してください。
(5)血液や汚物等が付着している場合には、石けんでよく洗浄後、使用してください。
(6)使用後は手を十分に乾燥させてください。（乾燥不十分のまま火気に手を近づけると引火するおそれがあります。）

〔成分〕

有効成分	エタノール（C_2H_6O）　76.9～81.4vol%
添加物	リン酸、グリセリン、アラントイン、ミリスチン酸イソプロピル、グリセリン脂肪酸エステル、パラオキシ安息香酸エチル、N-ヤシ油脂肪酸アシル-L-アルギニンエチル・DL-ピロリドンカルボン酸塩、ヒドロキシプロピルセルロース
性　状	無色澄明の粘性の液です。

〔保管及び取扱い上の注意〕

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
(4)火気に近づけないでください。
(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
(6)薬剤が床、家具、革製品、大理石や一部の宝石等に付着しないようにしてください。（変質又は変色のおそれがあります。）

Ⓡ登録商標