

# 単包装のアルコール含浸綿

外用殺菌消毒剤

# エタコット®

エタノール含浸綿

ETHACOTTO

- インスリン自己注射時等の皮膚の消毒に！
- ピンセット・体温計等の医療機器の消毒に！



脱脂綿は、広げると  
3.5 cm × 7 cm の  
大きさになります。



脱脂綿は、広げると  
4 cm × 8 cm の  
大きさになります。



## 【特 性】

- 消毒用エタノールと同じ濃度のエタノール（76.9～81.4 vol%）を含浸するアルコール綿です。
- 使いきりのパックタイプなので衛生的で、揮発による薬液含量低下がなく、微生物汚染による感染の心配がありません。
- 携帯に便利で、いつでも、どこでも手軽に使用できます。
- 毛羽立ちが少ない脱脂綿を使用しているため、消毒部位の繊維残留を抑えます。

# エタコット®のDRUG INFORMATION

| 商品名   | 和名  | エタコット®                  |           |  |      |     |    |                         |        |        |     |                           |                         |
|---|---|-------------------------|-----------|--|------|-----|----|-------------------------|--------|--------|-----|---------------------------|-------------------------|
|   | 洋名  | ETHACOTTO               |           |  |      |     |    |                         |        |        |     |                           |                         |
| 製造販売元   | 健栄製薬株式会社  |                         |           |  |      |     |    |                         |        |        |     |                           |                         |
| 日本標準商品分類番号  | 872615  | 承認番号                    | (13AP)330 |  |      |     |    |                         |        |        |     |                           |                         |
| 薬効分類  | 外用殺菌消毒剤   | 承認年月                    | 2001年5月   |  |      |     |    |                         |        |        |     |                           |                         |
| 区分  | 第3類医薬品  | 販売開始年月                  | 2001年11月  |  |      |     |    |                         |        |        |     |                           |                         |
| 使用上の注意  | <p><b>してはいけないこと</b></p> <p>(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)<br/> <b>次の部位には使用しないでください</b><br/>                     (1) 損傷のある皮膚。<br/>                     (2) 目の周囲、粘膜等。</p>  |                         |           |  |      |     |    |                         |        |        |     |                           |                         |
|   | <p><b>相談すること</b></p> <p>1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください<br/>                     (1) 医師の治療を受けている人。<br/>                     (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。<br/>                     2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、添付文書等を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください</p>   |                         |           |  |      |     |    |                         |        |        |     |                           |                         |
|   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>関係部位</th> <th>症状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>皮膚</td> <td>発疹・発赤、かゆみ</td> </tr> </tbody> </table>  |                         |           |  | 関係部位 | 症状  | 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ               |        |        |     |                           |                         |
|   | 関係部位  | 症状                      |           |  |      |     |    |                         |        |        |     |                           |                         |
| 皮膚  | 発疹・発赤、かゆみ   |                         |           |  |      |     |    |                         |        |        |     |                           |                         |
| <p><b>その他の注意</b></p> <p>本剤の使用により、アレルギーテストの検査に影響を及ぼすことがあります。</p> |   |                         |           |  |      |     |    |                         |        |        |     |                           |                         |
| 効能効果  | 手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒。   |                         |           |  |      |     |    |                         |        |        |     |                           |                         |
| 用法用量  | そのまま塗擦、清浄用として用いてください。   |                         |           |  |      |     |    |                         |        |        |     |                           |                         |
|   | <p><b>〈用法用量に関連する注意〉</b></p> <p>(1) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。<br/>                     なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。<br/>                     (2) 過度に使用すると、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあります。<br/>                     (3) 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意してください。<br/>                     (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。<br/>                     (5) 外用にのみ使用してください。<br/>                     (6) アルコール分がタンパク質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、医療機器等を清拭する際は血清、膿汁等を十分に洗い落してから使用してください。</p> |                         |           |  |      |     |    |                         |        |        |     |                           |                         |
| 成分  | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">1包中</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>76.9～81.4 vol%<br/>エタノール</td> <td>1.0 mL</td> <td>2.0 mL</td> </tr> <tr> <td>脱脂綿</td> <td>(3.5 cm×7 cm、1枚)<br/>0.2 g</td> <td>(4 cm×8 cm、1枚)<br/>0.4 g</td> </tr> </tbody> </table>  |                         |           |  |      | 1包中 |    | 76.9～81.4 vol%<br>エタノール | 1.0 mL | 2.0 mL | 脱脂綿 | (3.5 cm×7 cm、1枚)<br>0.2 g | (4 cm×8 cm、1枚)<br>0.4 g |
|   |   | 1包中                     |           |  |      |     |    |                         |        |        |     |                           |                         |
| 76.9～81.4 vol%<br>エタノール   | 1.0 mL  | 2.0 mL                  |           |  |      |     |    |                         |        |        |     |                           |                         |
| 脱脂綿   | (3.5 cm×7 cm、1枚)<br>0.2 g   | (4 cm×8 cm、1枚)<br>0.4 g |           |  |      |     |    |                         |        |        |     |                           |                         |
| <p>添加物としてイソプロパノールを含有します。</p>                                    |   |                         |           |  |      |     |    |                         |        |        |     |                           |                         |
| 保管及び取扱い上の注意   | <p><b>〈貯法〉</b> 気密容器・火気を避けて室温保存<br/> <b>〈使用期限〉</b> 容器等に表示</p>  |                         |           |  |      |     |    |                         |        |        |     |                           |                         |
|   | <p>(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。<br/>                     (2) 小児の手の届かない所に保管してください。<br/>                     (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)<br/>                     (4) 火気に近づけないでください。<br/>                     (5) 綿の表面又は内部にある小さな黒又は黄色の斑点状のものは、ワタの種子です。(変質したものではありません。)</p>  |                         |           |  |      |     |    |                         |        |        |     |                           |                         |
| 包装  | 〔パックタイプ〕：〔3.5 cm×7 cm〕1枚×70包、1枚×280包、〔4 cm×8 cm〕1枚×300包   |                         |           |  |      |     |    |                         |        |        |     |                           |                         |

## 文献請求先

健栄製薬株式会社 学術情報部  
 〒541-0044 大阪市中央区伏見町2丁目5番8号 電話番号 06(6231)5626 FAX番号 06(6204)0750