

健栄製薬の速乾性すり込み式 手指消毒剤

液状製剤



ラビショット®

ラビショット®A

手ピカ®ローションP

消毒用エタプラス®

ラビネット®消毒液0.2%

ステリクロン®ハンドローション0.5%

ゲル状製剤



ラビジェル®

ラビジェル®A

手ピカ®ジェルP

エタプラス®ゲル

エタプラス®ゲルA



日本標準商品分類番号	872615
承認番号	22600APX00001
承認年月	2014年1月
販売開始	2014年1月



オートディスペンサーUC専用

第3類医薬品

液状

弱酸性

速乾性すり込み式手指消毒剤

ラビショット®

RABISHOT®



リールストラップ
(60mLに対応)

ノンエンベロープウイルスなどのアルコール抵抗性ウイルスにも効果的な手指消毒剤です。

組成性状	有効成分	エタノール (C ₂ H ₆ O)	76.9～81.4vol%
	添加物	リン酸、グリセリン、アラントイン、ミリスチン酸イソプロピル、グリセリン脂肪酸エステル、パラオキシ安息香酸エチル、N-ヤシ油脂肪酸アシル-L-アルギニンエチル・DL-ピロリドンカルボン酸塩	
	性状	無色透明の液です。	

効能効果 手指の殺菌・消毒

用法用量

適量を手掌にとり、乾燥するまで摩擦してください。
 〈用法用量に関連する注意〉
 (1)用法用量を厳守してください。
 (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
 (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
 (4)外用にのみ使用してください。
 (5)血液や汚物等が付着している場合には、石けんでよく洗浄後、使用してください。
 (6)使用後は手を十分に乾燥させてください。(乾燥不十分のまま火気に手を近づけると引火するおそれがあります。)

日本標準商品分類番号	_____
承認番号	22500DZX01419
承認年月	2013年11月
販売開始	2013年12月



オートディスペンサーUC専用

指定医薬部外品

液状

弱酸性

速乾性すり込み式手指消毒剤

ラビショットA®

RABISHOT® A



ノンエンベロープウイルスなどのアルコール抵抗性ウイルスにも効果的な手指消毒剤です。

組成性状	有効成分	エタノール (C ₂ H ₆ O)	76.9～81.4vol%
	添加物	リン酸、グリセリン、アラントイン、ミリスチン酸イソプロピル、グリセリン脂肪酸エステル、パラオキシ安息香酸エチル、N-ヤシ油脂肪酸アシル-L-アルギニンエチル・DL-ピロリドンカルボン酸塩	
	性状	無色透明の液です。	

効能効果 手指・皮膚の洗浄・消毒

用法用量

適量を手指にとり、塗布又は塗擦してください。
 〈用法用量に関連する注意〉
 (1)用法用量を厳守してください。
 (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
 (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
 (4)外用にのみ使用してください。
 (5)血液や汚物等が付着している場合には、石けんでよく洗浄後、使用してください。
 (6)使用後は手を十分に乾燥させてください。(乾燥不十分のまま火気に手を近づけると引火するおそれがあります。)

日本標準商品分類番号	872615
承認番号	22600APX00002
承認年月	2014年1月
販売開始	2014年1月



オートディスペンサーUC専用

第3類医薬品

ゲル状

弱酸性

速乾性すり込み式手指消毒剤

ラビジェル®

RABIGEL®



リールストラップ (60mLに対応)

ポーチ (250mLに対応)

ノンエンベロープウイルスなどのアルコール抵抗性ウイルスにも効果的な手指消毒剤です。

組成性状	有効成分	エタノール (C ₂ H ₆ O)	76.9～81.4vol%
	添加物	リン酸、グリセリン、アラントイン、ミリスチン酸イソプロピル、グリセリン脂肪酸エステル、パラオキシ安息香酸エチル、N-ヤシ油脂肪酸アシル-L-アルギニンエチル・DL-ピロリドンカルボン酸塩、ヒドロキシプロピルセルロース	
	性状	無色透明の粘性の液です。	

効能効果 手指の殺菌・消毒

用法用量

適量を手掌にとり、乾燥するまで摩擦してください。
 〈用法用量に関連する注意〉
 (1)用法用量を厳守してください。
 (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
 (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
 (4)外用にのみ使用してください。
 (5)血液や汚物等が付着している場合には、石けんでよく洗浄後、使用してください。
 (6)使用後は手を十分に乾燥させてください。(乾燥不十分のまま火気に手を近づけると引火するおそれがあります。)

日本標準商品分類番号	_____
承認番号	22500DZX01421
承認年月	2013年11月
販売開始	2013年12月



オートディスペンサーUC専用

指定医薬部外品

ゲル状

弱酸性

速乾性すり込み式手指消毒剤

ラビジェルA®

RABIGEL® A



ノンエンベロープウイルスなどのアルコール抵抗性ウイルスにも効果的な手指消毒剤です。

組成性状	有効成分	エタノール (C ₂ H ₆ O)	76.9～81.4vol%
	添加物	リン酸、グリセリン、アラントイン、ミリスチン酸イソプロピル、グリセリン脂肪酸エステル、パラオキシ安息香酸エチル、N-ヤシ油脂肪酸アシル-L-アルギニンエチル・DL-ピロリドンカルボン酸塩、ヒドロキシプロピルセルロース	
	性状	無色透明の粘性の液です。	

効能効果 手指・皮膚の洗浄・消毒

用法用量

適量を手指にとり、塗布又は塗擦してください。
 〈用法用量に関連する注意〉
 (1)用法用量を厳守してください。
 (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
 (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
 (4)外用にのみ使用してください。
 (5)血液や汚物等が付着している場合には、石けんでよく洗浄後、使用してください。
 (6)使用後は手を十分に乾燥させてください。(乾燥不十分のまま火気に手を近づけると引火するおそれがあります。)

日本標準商品分類番号	872615
承認番号	22100APX00549
承認年月	2009年6月
販売開始	2009年9月


第3類医薬品

速乾性すり込み式手指消毒剤

手ピカ[®]

TEPIKA[®] LOTION P



リールストラップ (60mLに対応)



ヒアルロン酸ナトリウム等の湿潤剤を配合し、手荒れに配慮した手指消毒剤です。

組成性状	有効成分	エタノール (C ₂ H ₆ O)	76.9～81.4vol%
	添加物	ヒアルロン酸Na、グリセリン、トコフェロール酢酸エステル、イソプロパノール	
	性状	無色透明の液です。	

効能効果 手指の殺菌・消毒

用法用量

適量を手掌にとり、乾燥するまで摩擦してください。
 〈用法用量に関連する注意〉
 (1)用法用量を厳守してください。
 (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
 (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
 (4)外用にのみ使用してください。
 (5)血液や汚物等が付着している場合には、石けんでよく洗浄後、使用してください。
 (6)使用後は手を十分に乾燥させてください。(乾燥不十分のまま火気に手を近づけると引火するおそれがあります。)

日本標準商品分類番号	872615
承認番号	(13AP)56
承認年月	2001年1月
販売開始	2001年9月


第3類医薬品

速乾性すり込み式手指消毒剤[®]

消毒用エタプラス

ETHAPLUS[®] FOR DISINFECTION



リールストラップ (60mLに対応)



よりシンプルに、より手荒れを少なくした手指消毒剤です。

組成性状	有効成分	エタノール (C ₂ H ₆ O)	76.9～81.4vol%
	添加物	イソプロパノール (溶剤) 4.9vol% グリセリン (湿潤剤) 0.9w/v%	
	性状	無色透明の液で、特異なおい及びやくような味があります。	

効能効果 手指・皮膚の殺菌・消毒

用法用量

塗擦又はガーゼ、脱脂綿等に浸して清拭してください。
 〈用法用量に関連する注意〉
 (1)用法用量を厳守してください。
 (2)局所刺激作用があるので、ガーゼ、脱脂綿等に浸して貼付しないでください。
 (3)過度に使用すると、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあります。
 (4)広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意してください。
 (5)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
 (6)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
 (7)外用にのみ使用してください。

日本標準商品分類番号	872615
承認番号	22100APX00047
承認年月	2009年2月
販売開始	2009年9月


第3類医薬品

速乾性すり込み式手指消毒剤

手ピカ[®]

TEPIKA[®] GEL P



リールストラップ (60mLに対応) ポーチ (250mLに対応)



ヒアルロン酸ナトリウム等の湿潤剤を配合し、手荒れに配慮した手指消毒剤です。

組成性状	有効成分	エタノール (C ₂ H ₆ O)	76.9～81.4vol%
	添加物	ヒアルロン酸Na、グリセリン、トコフェロール酢酸エステル、カルボキシビニルポリマー、トリエタノールアミン	
	性状	無色のわずかに混濁した粘性の液です。	

効能効果 手指の殺菌・消毒

用法用量

適量を手掌にとり、乾燥するまで摩擦してください。
 〈用法用量に関連する注意〉
 (1)用法用量を厳守してください。
 (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
 (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
 (4)外用にのみ使用してください。
 (5)血液や汚物等が付着している場合には、石けんでよく洗浄後、使用してください。
 (6)使用後は手を十分に乾燥させてください。(乾燥不十分のまま火気に手を近づけると引火するおそれがあります。)

日本標準商品分類番号	872615
承認番号	(17AP)433
承認年月	2005年5月
販売開始	2006年1月


第3類医薬品

速乾性すり込み式手指消毒剤

エタプラス[®]

ETHAPLUS[®] GEL



リールストラップ (60mLに対応) ポーチ (250mLに対応)



手荒れ、使用感に配慮したゲルタイプの手指消毒剤です。

組成性状	有効成分	エタノール (C ₂ H ₆ O)	76.9～81.4vol%
	添加物	ヒアルロン酸Na、グリセリン、トコフェロール酢酸エステル、カルボキシビニルポリマー、トリエタノールアミン	
	性状	無色のわずかに混濁した粘性の液です。	

効能効果 手指の殺菌・消毒

用法用量

適量を手掌にとり、乾燥するまで摩擦してください。
 〈用法用量に関連する注意〉
 (1)用法用量を厳守してください。
 (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
 (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
 (4)外用にのみ使用してください。
 (5)血液や汚物等が付着している場合には、石けんでよく洗浄後、使用してください。
 (6)使用後は手を十分に乾燥させてください。(乾燥不十分のまま火気に手を近づけると引火するおそれがあります。)

日本標準商品分類番号	872619
承認番号	22000AMX02400
承認年月	2008年10月
販売開始	2008年12月



薬価基準対象外

速乾性すり込み式手指消毒剤
ラビネット®消毒液0.2%
 RABINET® DISINFECTANT SOLUTION 0.2%

リールストラップ
 (100mLに対応)



手荒れに配慮した手指消毒剤です。

組成
 性状

〈組成〉
 100 mL 中 ベンザルコニウム塩化物 0.2g 含有 (0.2w/v%)。添加物としてエタノール、尿素、グリセリン、トコフェロール酢酸エステル、アラントイン、N-ヤン油脂脂肪酸アシルL-アルギニンエチル-DL-ピロリドンカルボン酸塩を含有する。
 〈性状〉
 エタノール (日局エタノール83 vol%) を含有し、速乾性を有する無色透明の液である。
 比重 (20度、20度) : 0.858 ~ 0.868

効能
 効果

医療施設における医師、看護師等の医療従事者の手指消毒

用法
 用量

1. 医療従事者の通常の手指消毒の場合
 本剤約 3 mL を 1 回手掌にとり、乾燥するまで摩擦する。ただし、血清、膿汁等の有機物が付着している場合は、十分に洗い落した後、本剤による消毒を行う。
2. 術前・術後の術者の手指消毒の場合
 手指及び前腕部を石けんでよく洗浄し、水で石けん分を十分に洗い落した後、本剤約 3 mL を手掌にとり、乾燥するまで摩擦し、更にこの本剤による消毒を 2 回繰り返す。

日本標準商品分類番号	872619
承認番号	(18AM) 10195
承認年月	2006年3月
販売開始	2007年2月



薬価基準対象外

速乾性すり込み式手指消毒剤
**ステリクワン®
 ハンドローション0.5%**
 STERICLON® HAND LOTION 0.5%



持続性に優れた速乾性すり込み式手指消毒剤です。

組成
 性状

〈組成〉
 100 mL 中 クロルヘキシジングルコン酸塩 0.5g 含有 (0.5 w/v%)。添加物としてエタノール、尿素、グリセリン、トコフェロール酢酸エステル、アラントインを含有する。
 〈性状〉
 エタノール (日局エタノール83 vol%) を含有し、速乾性を有する無色～微黄色透明の液である。
 比重 (20度、20度) : 約0.86

効能
 効果

手指の消毒

用法
 用量

本剤をそのまま用いる。
 (用法・用量に関連する使用上の注意)
 手指の消毒における使用濃度は、クロルヘキシジングルコン酸塩として 0.1～0.5% であり、本剤は 0.5% であるので、そのまま用いる。

日本標準商品分類番号	
承認番号	(16D) 1626
承認年月	2004年8月
販売開始	2005年1月



指定医薬部外品

速乾性すり込み式手指消毒剤
イタプラスゲルA
 ETHAPLUS® GEL A

リールストラップ
 (60mLに対応)



手荒れ、使用感に配慮したゲルタイプの手指消毒剤です。

組成
 性状

有効成分	エタノール (C ₂ H ₆ O)	76.9～81.4 vol%
添加物	ヒアルロン酸Na、グリセリン、トコフェロール酢酸エステル、カルボキシビニルポリマー、トリエタノールアミン	
性状	無色のわずかに混濁した粘性の液です。	

効能
 効果

手指・皮膚の洗浄・消毒

用法
 用量


適量を手指にとり、塗布又は塗擦してください。
 (用法用量に関連する注意)
 (1) 用法用量を厳守してください。
 (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させていただきます。
 (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
 (4) 外用にのみ使用してください。
 (5) 血液や汚物等が付着している場合には、石けんでよく洗浄後、使用してください。
 (6) 使用後は手を十分に乾燥させてください。(乾燥不十分のまま火気に手を近づけると引火するおそれがあります。)

手荒れ対策用ハンドケア商品

バリア&保湿のハンドケア乳液

**手ピカ®
 スキンバリア**

TEPIKA® SKIN BARRIER



バリア&保湿成分ポリクオタニウム-61配合

成分

水、グリセリン、BG、シクロペンタシロキサン、PEG-32、ジメチコン、ヒドロキシエチルセルロース、ポリクオタニウム-61、(ジメチコン/ビニルジメチコン) クロスポリマー、カルボマー、アルギニン、フェノキシエタノール、メチルパラベン、トコフェロール、グリチルリチン酸 2K、酢酸トコフェロール

使用
 方法

作業の前に手肌に塗布してください。
 (1) 手を洗い、水気をふき取り、よく乾かします。
 (2) ポンプを軽く押し、適量 (小豆大、約0.2mL) をとり、まんべんなく手肌にすり込んでください。(強く押しと出過ぎますので注意してください)
 (3) 2～3分間自然乾燥させると、保護膜が形成されて、皮膚保護作用があらわれます。
 (4) 作業内容や手肌の状態により、3～4時間おきに追加塗布すると、より効果的です。

ラビショット®

【使用上の注意】

【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の部位には使用しないでください

- (1) 損傷のある皮膚。
- (2) 目の周囲、粘膜等。

【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (6) 開封時、容器の肩部又は底部をもち、液がとびださないように、キャップを開けてください。
- (7) 薬剤が床や家具等に付着しないようにしてください。(変質又は変色のおそれがあります。)

【包装】

60mL×10 (スプレー式携帯用)
300mL
500mL
600mL (オートディスペンサーUC専用)
1000mL

ラビショットA®

【使用上の注意】

【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の人には使用しないでください

- (1) 患部が広範囲の人。
- (2) 深い傷やひどいやけどの人。

【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談してください
使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (6) 開封時、容器の肩部又は底部をもち、液がとびださないように、キャップを開けてください。
- (7) 薬剤が床、家具、革製品、大理石や一部の宝石等に付着しないようにしてください。(変質又は変色のおそれがあります。)

【包装】

500mL
1000mL

手ピカ®ローションP

【使用上の注意】

【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の部位には使用しないでください

- (1) 損傷のある皮膚。
- (2) 目の周囲、粘膜等。

【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (6) 開封時、容器の肩部又は底部をもち、液がとびださないように、キャップを開けてください。
- (7) 薬剤が床や家具等に付着しないようにしてください。(変質又は変色のおそれがあります。)

【包装】

60mL×10 (スプレー式携帯用)
300mL
500mL
1000mL
5L

ラビジェル®

【使用上の注意】

【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の部位には使用しないでください

- (1) 損傷のある皮膚。
- (2) 目の周囲、粘膜等。

【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (6) 薬剤が床や家具等に付着しないようにしてください。(変質又は変色のおそれがあります。)

【包装】

60mL×10
250mL
500mL
600mL (オートディスペンサーUC専用)

ラビジェルA®

【使用上の注意】

【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の人には使用しないでください

- (1) 患部が広範囲の人。
- (2) 深い傷やひどいやけどの人。

【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談してください
使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (6) 薬剤が床、家具、革製品、大理石や一部の宝石等に付着しないようにしてください。(変質又は変色のおそれがあります。)

【包装】

500mL

手ピカ®ジェルP

【使用上の注意】

【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の部位には使用しないでください

- (1) 損傷のある皮膚。
- (2) 目の周囲、粘膜等。

【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (6) 薬剤が床や家具等に付着しないようにしてください。(変質又は変色のおそれがあります。)

【包装】

60mL×10
250mL
500mL
500mL (ショートノズル)

消毒用Iタプラス®

【使用上の注意】

【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

- (1) 損傷のある皮膚。
- (2) 目の周囲、粘膜等。

【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、灼熱感

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。

- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (6) 開封時、容器の肩部又は底部をもち、液がとびださないように、キャップを開けてください。

【包装】

- 60mL×10 (スプレー式携帯用)
- 300mL
- 500mL
- 600mL (オートディスペンサーUC専用)
- 1000mL
- 5L

リネット®消毒液0.2%

【禁忌 (次の場合には使用しないこと)】

損傷のある手指 [エタノールを含有するので、損傷部位への使用により、刺激作用を有する。]

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 眼に入らないように注意すること。
眼に入った場合には水でよく洗い流すこと。
- (2) 本剤は希釈せず、原液のまま使用すること。

2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

	頻度不明
過敏症注)	紅斑、痒疹感、浮腫等
皮膚注)	刺激症状

注)このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

3. 適用上の注意

- (1) 投与経路：手指消毒以外の目的には使用しないこと。
- (2) 使用時：
1) 反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので、注意すること。
2) 血清、膿汁等の有機性物質は殺菌作用を減弱させるので、これらが付着している場合は、十分に洗い落してから使用すること。
3) 石けん類は本剤の殺菌作用を減弱させるので、予備洗浄に用いた石けん分を十分に洗い落してから使用すること。
4) 本剤で消毒した手指で、2.5kg以下の低出生体重児を取扱う場合、低出生体重児の皮膚がかぶれることがあるので十分に注意すること。

【取扱い上の注意】

【注意】

- (1) 引火性、爆発性があるため、火気には十分注意すること。
- (2) 開封時、容器の肩部又は底部をもち、液がとびださないように、キャップを開けること。

【安定性試験】

最終包装製品を用いた加速試験(40℃、75%RH、6ヶ月)の結果、通常の市場流通下において3年間安定であることが推測された。

【包装】

- 100mL (スプレー式携帯用)
- 500mL
- 1000mL
- 5L

ステリコン®ハンドーション0.5%

【禁忌 (次の場合には使用しないこと)】

- (1) クロルヘキシジン製剤に対し過敏症の既往歴のある者
- (2) 腔、膀胱、口腔等の粘膜面 [クロルヘキシジン製剤の上記部位への使用により、ショック、アナフィラキシーの症状の発現が報告されている。]
- (3) 損傷皮膚及び粘膜 [エタノール含有液なので、損傷皮膚及び粘膜への使用により、刺激作用がある。]

【使用上の注意】

1. 慎重投与 (次の場合には慎重に使用すること)

- (1) 薬物過敏症の既往歴のある者
- (2) 喘息等のアレルギー疾患の既往歴、家族歴のある者

2. 重要な基本的注意

(1) ショック、アナフィラキシー等の反応を予測するため、使用に際してはクロルヘキシジン製剤に対する過敏症の既往歴、薬物過敏体質の有無について十分な問診を行うこと。

(2) 本剤は希釈せず、原液のまま使用すること。

- (3) 眼に入らないように注意すること。
眼に入った場合には直ちに水でよく洗い流すこと。

3. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

(1) 重大な副作用

ショック (頻度不明)、アナフィラキシー (頻度不明)：ショック、アナフィラキシーがあらわれることがあるので観察を十分に行い、血圧低下、蕁麻疹、呼吸困難等があらわれた場合は、直ちに使用を中止し、適切な処置を行うこと。

(2) その他の副作用

	頻度不明
過敏症注1)	発疹・発赤、蕁麻疹等
皮膚注2)	刺激症状

注1)このような症状があらわれた場合には、直ちに使用を中止し、再使用しないこと。

注2)このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

4. 適用上の注意

- (1) 投与経路：手指消毒以外の目的には使用しないこと。
- (2) 使用時：
1) 反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので、注意すること。
2) 血清、膿汁等の有機性物質は殺菌作用を減弱させるので、これらが付着している場合は、十分に洗い落してから使用すること。
3) 石けん類は本剤の殺菌作用を減弱させるので、予備洗浄に用いた石けん分を十分に洗い落してから使用すること。
4) 溶液の状態が長時間皮膚と接触させた場合に皮膚化学熱傷を起こしたとの報告があるので、注意すること。

5. その他の注意

クロルヘキシジングルコン酸塩製剤の投与により、ショック症状を起こした患者のうち、数例について、血清中にクロルヘキシジンに特異的なIgE抗体が検出されたとの報告がある。

【取扱い上の注意】

【注意】

- (1) 本剤は引火性、爆発性があるため、火気には十分注意すること。
- (2) 本剤の付着した白布を直接、次亜塩素酸ナトリウム等の塩素系漂白剤で漂白すると、褐色のシミを生じることがあるので、漂白剤としては過炭酸ナトリウム等の酸素系漂白剤が適当である。
- (3) 開封時、容器の肩部又は底部をもち、液がとびださないように、キャップを開けること。

【包装】

- 500mL
- 1000mL

手ピカス®スキンバリア

【使用上の注意】

- お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。
- お肌に合わないとき、また、使用中や使用したお肌に直射日光があたって、赤味、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合は使用を中止し、皮膚科専門医等にご相談ください。そのまま使用を続けると、症状が悪化させることがあります。
- 傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位にはお使いにならないでください。
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- 高温または低温の場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。

【包装】

- 250mL

Iタプラス®ゲル

【使用上の注意】

【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

- (1) 損傷のある皮膚。
- (2) 目の周囲、粘膜等。

【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。

- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (6) 薬剤が床や家具等に付着しないようにしてください。(変質又は変色のおそれがあります。)

【包装】

- 60mL×10
- 250mL
- 500mL
- 600mL (オートディスペンサーUC専用)
- 5L

Iタプラス®ゲルA

【使用上の注意】

【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人には使用しないでください

- (1) 患部が広範囲の人。
- (2) 深い傷やひどいやけどの人。

【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (6) 薬剤が床や家具等に付着しないようにしてください。(変質又は変色のおそれがあります。)

【包装】

- 60mL×10
- 500mL

【詳細は添付文書等をご参照ください。】

資料請求・お問い合わせ先
健栄製薬株式会社 学術情報部

〒541-0044 大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
TEL：06-6231-5822 FAX：06-6204-0750