

消毒用エタプラス[®] 第3類医薬品


■手指消毒法

- ①手のひらに十分にスプレーします。
- ②手指全体にすり込むよう伸ばし、乾燥するまで、よくすり込みます。



折りたたんで廃棄しやすいボトルを採用

- ①折り目に沿ってつぶしてください。
- ②空気が入らないよう、キャップをしめてください。



キャップ: PP
 ボトル: PE
 ポンプ: PP, 金属

バックン: PE, PP
 ラベル: PE
 ポンプ袋: PE

目安
 400
 300
 200
 100

開封日
 年 月 日

第3類医薬品

とりかえの目安

年 月 日

速乾性すり込み式手指消毒剤[®] 消毒用エタプラス

アルコール類*水溶性*危険等級II



500mL

飲用不可

火気厳禁



健栄製薬株式会社
 大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
 電話番号 06(6231)5626

貯法: 気密容器
 火気を避けて
 室温保存

消毒用エタプラスは、エタノール (C₂H₆O) 76.9～81.4 vol% を含有する速乾性手指消毒剤です。溶剤としてイソプロパノール 4.9 vol%、湿潤剤としてグリセリン 0.9 w/v% を含有する無色透明の液で、特異なおい及びやくような味があります。

消毒用エタプラス[®] 第3類医薬品

△使用上の注意

【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

- (1) 損傷のある皮膚。
 (2) 目の周囲、粘膜等。

【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- (1) 医師の治療を受けている人。
 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、灼熱感

【効能効果】

手指・皮膚の殺菌・消毒

【用法用量】

塗擦又はガーゼ、脱脂綿等に浸して清拭してください。

【用法用量に関連する注意】

- (1) 用法用量を厳守してください。
 (2) 局所刺激作用があるので、ガーゼ、脱脂綿等に浸して貼付しないでください。(右側面へ続く)



折り目

消毒用エタプラス[®] 第3類医薬品

(左側面より続く)

- (3) 過度に使用すると、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあります。
- (4) 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意してください。
- (5) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (6) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合は、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (7) 外用にのみ使用してください。

【組成性状】

有効成分	エタノール (C ₂ H ₆ O)	76.9～81.4 vol%
添加物	イソプロパノール (溶剤)	4.9 vol%
	グリセリン (湿潤剤)	0.9 w/v%
性状	無色透明の液で、特異なおい及びやくような味があります。	

【成分に関連する注意】

アレルギーテストの検査を受ける場合には、本剤を使用していることを医師に知らせてください。(アレルギーテストの検査値に影響をおよぼすことがあります。)

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (6) 開封時、容器の肩部又は底部をもち、液がとびださないように、キャップを開けてください。
- (7) 薬剤が床や家具等に付着しないようにしてください。(変質又は変色のおそれがあります。)

®登録商標

副作用被害救済制度の問合せ先
 (独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
 電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)