

ケンエー 綿球・綿棒 シリーズ

医療現場のニーズをカタチにした、
豊富な製品ラインナップ



綿球シリーズ

～ 経済的で種類豊富な単包タイプの消毒剤綿球～

特 徴 単包装の消毒剤含浸綿球

豊富な
品揃え

→ 様々な消毒剤を浸み込ませた綿球を取り揃えています！

経済的

→ 使い残しによる消毒剤・綿球の無駄な消費、容器等の洗浄・滅菌にかかる費用が削減できます！

便利

→ 携帯に便利で、いつでもどこでも使用可能！

衛生的

→ 単包装なので、微生物汚染の心配がありません！

安心

→ 個々の容器に使用期限を記載しているので、分割しても使用期限の確認が可能です！

使用方法

1



使用する綿球分の容器を、ねじの様に折り取って使用します。

2



フィルムは1球ずつ開封して使用することができます。

3



フィルムはまとめて開封して使用することもできます。

0.025%ベンザルコニウム塩化物液含浸綿球

滅菌
製剤

ガルコニン®0.025%綿球14・20

成分

綿球 1 球あたり

0.025w/v%ベンザルコニウム塩化物液 1.8mL 含浸（#14 綿球）

0.025w/v%ベンザルコニウム塩化物液 4.4mL 含浸（#20 綿球）

特徴

- ① 創傷部位・粘膜の消毒、泌尿器科・産婦人科での陰部消毒、歯科領域での口腔内消毒、在宅での自己導尿カテーテル挿入時の陰部消毒に適しています。
- ② 開封前の無菌を保証した滅菌製剤です。（滅菌処理を行っています。）

包装

#14 綿球×1 球×90（6 連球×15）、#20 綿球×1 球×90（6 連球×15）



その他

指定医薬部外品『ガルコニン0.025%綿球C（包装：#20 綿球×1 球×90）』のご用意もあります。

10%ポビドンヨード液含浸綿球

イタイン10%綿球14・20・30・40

成分

綿球 1 球あたり
 10w/v%ポビドンヨード液 1.8mL 含浸（#14 綿球）
 10w/v%ポビドンヨード液 4.4mL 含浸（#20 綿球）
 10w/v%ポビドンヨード液 12mL 含浸（#30 綿球）
 10w/v%ポビドンヨード液 30mL 含浸（#40 綿球）
 グリセリン、クエン酸水和物、リン酸水素2 Na、
 ラウロマクロゴール、pH調整剤

特徴

- ①手術部位、血管留置カテーテル挿入部位、皮膚・粘膜の創傷部位の消毒に適しています。
- ②開封前の無菌を保証した滅菌製剤です。（滅菌処理を行っています。）
- ③様々な用途に対応できるよう、サイズを豊富に取り揃えています。

包装

#14 綿球×1 球×90（6 連球×15）、
 #20 綿球×1 球×90（6 連球×15）、
 #20 綿球×3 球×30、
 #30 綿球×1 球×36（3 連球×12）、
 #40 綿球×3 球×12



その他 一般用医薬品（第3類）『ポビコット綿球P（包装：#14 綿球×1 球×90、#20 綿球×1 球×90）』のご用意もあります。

2%チオ硫酸ナトリウム・エタノール含浸綿球

ハイポ2%AL 綿球14・20・30

成分

綿球 1 球あたり
 2w/v%チオ硫酸ナトリウム液 1.8mL 含浸（#14 綿球）
 2w/v%チオ硫酸ナトリウム液 4.4mL 含浸（#20 綿球）
 2w/v%チオ硫酸ナトリウム液 12mL 含浸（#30 綿球）
 エタノール（日局エタノール65vol%）、pH調整剤

特徴

- ①ヨウ素製剤で着色した皮膚、器具・布などの脱色に用います。
- ②エタノール濃度が高い（日局エタノール65vol%含有）ので、消毒効果が期待できます。

包装

#14 綿球×1 球×90（6 連球×15）、#20 綿球×1 球×90（6 連球×15）、#30 綿球×1 球×36（3 連球×12）



0.5 %クロルヘキシジングルコン酸塩・エタノール含浸綿球

ステリコン®0.5%AL綿球14・20

成 分

綿球 1 球あたり
0.5w/v%クロルヘキシジングルコン酸塩液 1.8mL含浸（#14綿球）
0.5w/v%クロルヘキシジングルコン酸塩液 4.4mL含浸（#20綿球）
エタノール（日局エタノール83vol%）

特 徴

- ①クロルヘキシジングルコン酸塩が皮膚に残留し、消毒効果が持続するので血管留置カテーテル挿入部位や手術部位の消毒に適しています。
- ②単包装なので、薬液の揮発による消毒効果の低下がありません。

包 装

#14綿球×1 球×90（6 連球×15）、#20綿球×1 球×90（6 連球×15）



0.05%クロルヘキシジングルコン酸塩液含浸綿球

滅菌
製剤

ステリコン®0.05%綿球P

成 分

綿球 1 球あたり
0.05w/v%クロルヘキシジングルコン酸塩液 4.4mL含浸

特 徴

- ①創傷部位の消毒に適しています。
- ②開封前の無菌を保証した滅菌製剤です。（滅菌処理を行っています。）

包 装

#20綿球×1 球×90（6 連球×15）



エタノール含浸綿球

エタコット®綿球

成 分

綿球 1 球あたり
76.9～81.4vol%エタノール 4.4mL含浸
イソプロパノール3.7vol%

特 徴

- ①アルコール綿に比べ、薬液の含浸量が多いため、輸液ライン、カテーテルの接続部の消毒に適しています。
- ②単包装なので、薬液の揮発による消毒効果の低下がありません。

包 装

#20綿球×1 球×90（6 連球×15）



綿棒シリーズ

～鑷子などの器具が不要で手が汚れにくい単包タイプの消毒剤綿棒～

特徴.1 単包装の消毒剤含浸綿棒

簡単

鑷子などの器具の準備が不要。
既に消毒剤を含浸させているので、**開封後、即使用できます！**

経済的

使い残しによる消毒剤・綿棒の無駄な消費、容器等の洗浄・滅菌にかかる費用が削減できます！

便利

携帯に便利で、いつでもどこでも使用可能なので、特に訪問看護や在宅医療に便利！

衛生的

単包装なので、微生物汚染の心配がありません！

安心

個々の容器に使用期限を記載しているので、分割しても使用期限の確認が可能です！

特徴.2 工夫された容器・綿棒

1 持手タブ

開封口に持手タブを設けているので、開封が容易です。

2 太い軸

適度な柔軟性のある太軸の綿棒を用いています。

3 毛羽立ちの少ない脱脂綿

消毒部位の繊維残留を抑えるため、毛羽立ちの少ない脱脂綿を用いています。

4 軸受けリブ


軸に薬液が付着するのを極力防ぐため、トレー底部に軸が接触しないよう、軸受けリブを設けています。

5 液止めリブと液溜り

軸に薬液が付着するのを極力防ぐため、薬液が軸部へ流出しないよう、液止めリブと液溜りを設けています。

6 厚みのあるトレー

脱脂綿部の型崩れを防ぐため、厚みのあるトレーを用いています。



使用方法

● 1本ずつ開封する場合



トレー1本をミシン目より切りはなします（イオダイン10%綿棒27を除く）。
タブを持ち、フィルムをはぎ取ります。

● 2本まとめて開封する場合



トレー2本分のタブを持ち、フィルムをまとめてはぎ取ります（イオダイン10%綿棒27を除く）。

10%ポビドンヨード液含浸綿棒

滅菌
製剤

イオダイン10%綿棒12・16・27

成分

綿棒1本あたり
10w/v%ポビドンヨード液1.4mL含浸（#12綿棒）
10w/v%ポビドンヨード液4.3mL含浸（#16綿棒）
10w/v%ポビドンヨード液18mL含浸（#27綿棒）
ヨウ化カリウム、グリセリン、クエン酸水和物、
リン酸水素2Na、ラウロマクロゴール、pH調整剤

特徴

- ①手術部位、血管留置カテーテル挿入部位、皮膚・粘膜の創傷部位の消毒に適しています。
- ②開封前の無菌を保証した滅菌製剤です。（滅菌処理を行っています。）
- ③様々な用途に対応できるように、サイズを豊富に取り揃えています。

包装

#12綿棒×1本×56（2連×28）、#16綿棒×1本×56（2連×28）、#27綿棒×1本×20



2%チオ硫酸ナトリウム・エタノール含浸綿棒

ハイポ2%AL綿棒16

成分

綿棒1本あたり
2w/v%チオ硫酸ナトリウム液5.0mL含浸
エタノール(日局エタノール65vol%)、pH調整剤

特徴

- ①ヨウ素製剤で着色した皮膚、器具・布などの脱色に用います。
- ②エタノール濃度が高い(日局エタノール65vol%含有)ので、消毒効果が期待できます。

包装

#16綿棒×1本×56(2連×28)



0.025%ベンザルコニウム塩化物液含浸綿棒

滅菌
製剤

ザルコニ®0.025%綿棒12・16

成分

綿棒1本あたり
0.025w/v%ベンザルコニウム塩化物液1.5mL含浸(#12綿棒)
0.025w/v%ベンザルコニウム塩化物液4.6mL含浸(#16綿棒)

特徴

- ①創傷部位・粘膜の消毒、泌尿器科・産婦人科での陰部消毒、歯科領域での口腔内消毒、在宅での自己導尿カテーテル挿入時の陰部消毒に適しています。
- ②開封前の無菌を保証した滅菌製剤です。(滅菌処理を行っています。)

包装

#12綿棒×1本×56(2連×28)、#16綿棒×1本×56(2連×28)



0.05%クロルヘキシジングルコン酸塩液含浸綿棒

滅菌
製剤

ステリコン®0.05%綿棒16

成分

綿棒1本あたり
0.05w/v%クロルヘキシジングルコン酸塩液
4.6mL含浸

特徴

- ①創傷部位の消毒に適しています。
- ②開封前の無菌を保証した滅菌製剤です。(滅菌処理を行っています。)

包装

#16綿棒×1本×56(2連×28)



製品ラインナップ

	品 名	区 分	包 装	JANコード	使用期限
綿 球	イオダイン10%綿球14	医療用	# 14綿球×1球×90 (6連球×15)	4987286204550	3年
	イオダイン10%綿球20	医療用	# 20綿球×1球×90 (6連球×15)	4987286202402	3年
			# 20綿球×3球×30	4987286210988	3年
	イオダイン10%綿球30	医療用	# 30綿球×1球×36 (3連球×12)	4987286204987	3年
	イオダイン10%綿球40	医療用	# 40綿球×3球×12	4987286212821	3年
	ザルコニン0.025%綿球14	医療用	# 14綿球×1球×90 (6連球×15)	4987286204215	2年
	ザルコニン0.025%綿球20	医療用	# 20綿球×1球×90 (6連球×15)	4987286204284	2年
	ハイポ2%AL綿球14	医療用	# 14綿球×1球×90 (6連球×15)	4987286203911	3年
	ハイポ2%AL綿球20	医療用	# 20綿球×1球×90 (6連球×15)	4987286203928	3年
	ハイポ2%AL綿球30	医療用	# 30綿球×1球×36 (3連球×12)	4987286213392	3年
	ステリクロン0.5%AL綿球14	医療用	# 14綿球×1球×90 (6連球×15)	4987286203959	2年
	ステリクロン0.5%AL綿球20	医療用	# 20綿球×1球×90 (6連球×15)	4987286203966	2年
	ステリクロン0.05%綿球P	一般用 (第2類)	# 20綿球×1球×90 (6連球×15)	4987286311470	2年
	エタコット綿球	一般用 (第3類)	# 20綿球×1球×90 (6連球×15)	4987286306636	3年
綿 棒	イオダイン10%綿棒12	医療用	# 12綿棒×1本×56 (2連×28)	4987286200439	2年
	イオダイン10%綿棒16	医療用	# 16綿棒×1本×56 (2連×28)	4987286206554	2年
	イオダイン10%綿棒27	医療用	# 27綿棒×1本×20	4987286211480	2年
	ザルコニン0.025%綿棒12	医療用	# 12綿棒×1本×56 (2連×28)	4987286213156	3年
	ザルコニン0.025%綿棒16	医療用	# 16綿棒×1本×56 (2連×28)	4987286213163	3年
	ハイポ2%AL綿棒16	医療用	# 16綿棒×1本×56 (2連×28)	4987286212630	2年
	ステリクロン0.05%綿棒16	一般用 (第2類)	# 16綿棒×1本×56 (2連×28)	4987286312866	2年



健栄製薬株式会社

大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5626