

貯法：気密容器・室温保存
使用期限：容器等に表示

承認番号	22400APX00376
承認年月	2012年8月
販売開始	2012年9月

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

第2類医薬品

外用殺菌消毒剤

滅菌製剤

ステリコン[®]0.05%綿棒16

(0.05%クロルヘキシジングルコン酸塩液含浸綿棒)

△ 使用上の注意

※※ 【してはいけないこと】 ☒
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

※※ 次の人は使用しないでください
本剤又は本剤の成分、クロルヘキシジンによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

※※ 【相談すること】 ☒
1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 患部が広範囲の人。
- (4) 深い傷やひどいやけどの人。

※※ 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効 能 効 果】

すり傷、きり傷、かき傷、さし傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒

【用 法 用 量】

1 回数回患部に塗布してください。

〈用法用量に関連する注意〉

- (1) 用法用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 石けん類は本剤の殺菌作用を弱めるので、石けん分を洗い流してから使用してください。
- (5) 外用にのみ使用してください。

【成 分】

#16綿棒	綿棒1本あたり 0.05w/v%クロルヘキシジングルコン酸塩液 4.6mL 含浸
-------	--

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (5) 開封時及び開封後は、微生物による汚染に注意してください。脱脂綿部に指が触れないよう注意してください。
- (6) 開封後は速やかに使用してください。
- (7) 綿の表面又は内部にある小さなしみのような黒又は黄色の斑点状のものは、ワタの種子です。(変質したものではありません。)

【消費者相談窓口】

健栄製薬株式会社 学術情報部
〒541-0044 大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 (06) 6231-5626
FAX番号 (06) 6204-0750

※ 副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)