


消毒用エタノールIP^{ケン}

第3類医薬品

折りたたんで廃棄し やすいボトルを採用

省資源・ゴミ削減のため、減容
後の容積は約¹/₄になります。

- ① ボトルをつぶす。
- ② 空気が入らないよう、キャップをしめる。



健栄製薬(株)お問い合わせ先
電話番号(06)6231-5822
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkoujigai_camp/index.html
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

キャップ: PP
パッキン: PE,PP
ボトル: PE
ラベル: PS,PET

開封日

年 月 日

消毒薬

第3類医薬品

消毒用エタノールIP^{ケン}

アルコール類*水溶性*危険等級II*火気厳禁

500mL

飲用不可

目安
400
300
200
100



健栄製薬株式会社
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号

消毒用エタノールIP^{ケン}

第3類医薬品

使用に際しては、説明書をよく読んでください。

消毒用エタノールIP「ケンエー」 第3類医薬品

使用上の注意

してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の部位には使用しないでください
(1) 損傷のある皮膚。
(2) 目の周囲、粘膜等。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、灼熱感

【効能効果】

手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒

【用法用量】

塗擦又はガーゼ、脱脂綿等に浸して清拭してください。

(右側面へ続くノ)



4

製造番号

使用期限

消毒用エタノールIP^{ケン}

第3類医薬品

(ノ左側面より続く)

【用法用量に関連する注意】

- (1) 用法用量を厳守してください。
- (2) 局所刺激作用があるので、軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して貼付しないでください。
- (3) 過度に使用すると、脱脂綿による皮膚荒れを起こすことがあります。
- (4) 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意してください。
- (5) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (6) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (7) 外用にのみ使用してください。

【成分分量】

エタノール(C₂H₅O) 76.9～81.4 vol%を含有します。
添加物としてインプロパノールを含有します。

【成分に関連する注意】

アレルギーテストの検査を受ける場合には、本剤を使用していることを医師に知らせてください。(アレルギーテストの検査値に影響をおよぼすことがあります。)

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になり品質が変わることがあります。)
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (6) 開封時、容器の肩部又は底部をもち、液がとびださないように、キャップを開けてください。
- (7) 薬剤が床、家具、革製品、大理石や一部の宝石等に付着しないようにしてください。(変質又は変色のおそれがあります。)

【貯法】

気密容器。遮光して、火気を避けて室温保存。