

アセトアミノフェン錠「ケンエー」 を服用される方へ



アセトアミノフェンとは…

熱を下げ、痛みをやわらげる効果があります。
通常、各種疾患や症状における鎮痛、
急性上気道炎や小児科領域の解熱・鎮痛に
使用されます。



必ず医師や薬剤師の指示を守って 正しく服用してください。

●次のような方は、このお薬を服用する前に 必ず医師や薬剤師に相談してください


- 肝臓病の方、以前に肝臓病にかかったことのある方
- この薬の成分によりアレルギー症状が出たことのある方
- アルコール類を日常的にたくさん飲んでいる方
- 胃・十二指腸潰瘍、腎臓病、心臓病の方、以前にそれらにかかったことのある方

※裏面も必ずお読みください。

●アセトアミノフェンを含む他のお薬との併用について

アセトアミノフェンは、医師の処方により使用される場合のほかに、一般用医薬品（市販薬）で風邪薬や痛み止めの成分の1つとして使用されている場合があります。

アセトアミノフェンを含む他の医薬品との併用により、アセトアミノフェンの過量服用による重篤な肝障害があらわれるおそれがあります。



**アセトアミノフェンが含まれている
他のお薬と一緒に服用しないでください。**

●服用後のご注意（副作用等）

このお薬の主な副作用として、過敏症（発疹）、肝機能障害などが報告されています。特に、次のような症状に気づいたら、服用を中止し、医師や薬剤師にご相談ください。

**息苦しさ、全身の発疹・発赤、じんましん、
目の充血、けん怠感、食欲不振、
黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）**

※この他にも気になる症状があらわれた場合は、医師や薬剤師に相談してください。

●飲み忘れたときは…



**絶対に2回分を一度に
服用しないでください。**

できるだけ早く1回分を服用してください。

ただし、次に飲むまでに時間が短い場合（4時間未満）は、忘れた分は飲まず、次に飲む時間に1回分を服用してください。

