

P

外用殺菌消毒薬

第2類医薬品

日本薬局方

クレゾールケン液

(クレゾール 42 ~ 52 vol%を含有)

Saponated Cresol Solution

500 mL

販売元
健栄製薬株式会社
大阪府中央区伏見町2丁目5番6号
電話番号 06(6231)5626

製造販売元
大成薬品工業株式会社
福岡県筑後市大字熊野字屋敷998-1

**手指の殺菌・消毒、
便所などの殺菌・消毒に**

必ずうすめてご使用ください

使用に際しては、説明書きをよく読んでください。

P

⚠ 使用上の注意

⊗ **してはいけないこと**

[守らないと現在の症状が悪化したり副作用が起こりやすくなる]

1. **原液では使用せず、必ず薄めて使用すること。**
2. **次の部位には使用しないこと。**
目、目のまわり、口、唇等には使用しないこと。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流し、直ちに眼科医の診療を受けること。

☑ **相談すること**

1. 次の人は**使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。**
 - 1) 医師の治療を受けている人。
 - 2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 3) 患部が広範囲の人。
 - 4) 深い傷やひどいやけどの人。
2. **使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。**
3. **5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。**

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

効能・効果

手指・創傷面の殺菌・消毒
便所、便器、ごみ箱、たんつぼ、浄化そう等、疾病予防のために必要と思われる場所の殺菌・消毒

用法・用量

次のように水で希釈して洗浄する。

1. 手指の消毒の場合：2% (本剤の 50倍液)
2. 創傷面の殺菌の場合：1% (本剤の 100倍液)
3. 便所等の消毒の場合：3% (本剤の 33倍液)

<用法・用量に関連する注意>

1. 定められた用法・用量を厳守すること。
2. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
3. 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
4. 外用にのみ使用すること。
5. 本剤は水道水で希釈すると次第に混濁して沈殿することがあるが、このような場合には、上澄み液を使用すること。

<希釈方法>

- 33 倍液：本剤を30mLとり、水1Lにうすめる。
50 倍液：本剤を20mLとり、水1Lにうすめる。
100倍液：本剤を10mLとり、水1Lにうすめる。

使用期限

製造番号

成分・分量

本品は、クレゾール42~52vol%を含む。

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
2. 小児の手の届かない所に保管すること。
3. 他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり、品質が変わる。)
4. 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
5. 本剤のクレゾール臭の移行を避けるため、保管には注意すること。
6. 尿液が皮膚に付着した場合は、刺激症状を起こすので、ただちに石けん水と水で洗い流すこと。また、刺激症状(炎症)が起きた場合は医師の診療を受けること。(原液を取り扱う場合は、保護メガネ、ゴム手袋等を着用すること。)

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

ガラス：瓶
金属：キャップ
 外装フィルム：PP



LM155K

4