

外傷救急薬

第2類医薬品

ケンイーシロ

【使用上の注意】



注 意

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- 医師の治療を受けている人。
- 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 患部が広範囲の人。
- 深い傷やひどいやけどの人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効 能 効 果】

切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、虫さされ、かゆみ、創傷面の殺菌・消毒、痔疾の場合の肛門の殺菌・消毒

【用 法 用 量】

症状に応じ、1日数回患部に噴霧又は脱脂綿、ガーゼ等に浸して塗布してください

〈用法に関連する注意〉

- 用法を厳守してください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 外用にのみ使用してください。

【成 分 分 量】

100mL 中

ベンゼトニウム塩化物…………… 100mg
ジブカイン塩酸塩…………… 100mg
ナファゾリン塩酸塩…………… 100mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩…………… 200mg

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）

【包

装】

75mL（スプレー式）