

すり傷、創傷面の洗浄・消毒に

指定医薬部外品

オキシドール^剤

Oxydol A Kenei

【使用上の注意】



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は使用しないでください

- (1) 患部が広範囲の人。
- (2) 深い傷やひどいやけどの人。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

【効 能 効 果】

すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒

【用 法 用 量】

1 日数回患部に塗布又はガーゼ、脱脂綿等に浸して塗布してください。

〈用法用量に関連する注意〉

- (1) 用法用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

【成 分 分 量】

過酸化水素 (H₂O₂) 2.5～3.5w/v%を含有します。

添加物：フェナセチン、リン酸

【保管及び取扱
い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所 (30℃以下) に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (5) 保存中に瓶内の圧力が高くなっていることがあるので、瓶口を顔にむけぬようにして、キャップをあけてください。

〈貯法〉

気密容器。

遮光して、30℃以下で保存。

【包

装】

100 mL