

【効能効果】

○虫さされ、虫さされによるかゆみ

○気付け

【用法用量】

5～10倍に希釈して患部に軽く塗ってください。

気付けには、かるく臭いをかがせてください。

＜用法用量に関連する注意＞

(1)用法用量を厳守してください。

(2)局所刺激作用があるので、患部に軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して患部に貼付しないでください。

(3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(4)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。

(5)外用にのみ使用してください。

【成分分量】 1mL中

日局アンモニア水 1mL含有。

[アンモニア (NH₃) 9.5～10.5 w/v%を含有。]

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所（30℃以下）に密栓して保管してください。（揮発性の有効成分を含有しています。）

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）

(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

＜貯法＞

気密容器。30℃以下で保存。

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

虫さされ用薬

第3類医薬品

日本薬局方

アンモニア水

Ammonia Water

500mL



健栄製薬株式会社

大阪市中央区伏見町2丁目5番8号

電話番号 06(6231)5626

虫さされ、気付けに

使用に際しては、説明書きをよく読んで下さい。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

(1)目の周囲、粘膜（口唇等）

(2)傷口、ただれ、かぶれ

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1)医師の治療を受けている人。

(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(3)湿潤やただれのひどい人。

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、灼熱感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

製造
番号使用
期限

4

9872861307565

キャップ:PP
バックン:PE,PP
中 栓:PE
ボトル:PE

30