

P

飲用不可

P

外用殺菌消毒薬

第3類医薬品

イソプロパノール-150%P

火気注意 *飲用不可*

50 vol%

500 mL

ケンエー

健栄製薬株式会社

大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5626手指・皮膚の
殺菌・消毒に

使用に際しては、説明書きをよく読んでください。

⚠ 使用上の注意**してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

- (1)損傷のある皮膚。
- (2)目の周囲、粘膜等。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、灼熱感

【効能効果】 手指・皮膚の殺菌・消毒

【用法用量】 適量を脱脂綿、ガーゼ等に浸して患部に使用してください。

＜用法用量に関連する注意＞

- (1)用法用量を厳守してください。(2)局所刺激作用があるので、軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して患部に貼付しないでください。

製造
番号
使用
期限

- (3)過度に使用すると、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあります。(4)広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意してください。(5)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(6)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(7)外用にのみ使用してください。

【成分分量】イソプロパノール (C₃H₈O) 47.7～52.3 vol% を含有します。**＜成分に関連する注意＞**

アレルギーテストの検査を受ける場合には、本剤を使用していることを医師にお知らせください。(アレルギーテストの検査値に影響をおよぼすことがあります。)

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)火気に近づけないでください。(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。(6)薬剤が床や家具等に付着しないようにしてください。(変質又は変色のおそれがあります。)

＜貯法＞

気密容器。火気を避けて室温保存。

副作用被害救済制度の間合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)つぶして廃棄
しやすい
減容ボトル

4 987286 310473

キャップ: PP
ボトル: PE
外装フィルム: PE

第3類医薬品

イソプロパノール-150%P