

〈用法用量に関連する注意〉

- (1)用法用量を厳守してください。
- (2)顔面など皮膚の敏感な個所に適用する場合には、はじめは低濃度から開始してください。
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (5)外用にのみ使用してください。

〔成分分量〕

過酸化水素 (H₂O₂) 2.5～3.5 w/v% を含有します。

添加物：フェナセチン、リン酸

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない冷所（30℃以下）に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (5)保存中に瓶内の圧力が高くなっていることがありますので、瓶口を顔にむけぬようにして、キャップをあけてください。

〈貯法〉

気密容器。遮光して30℃以下で保存。

副作用被害救済制度の問合せ先
 (独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
 電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)


製造
番号
使用
期限

外用殺菌消毒薬

第3類医薬品

日本薬局方

オキシドール



500mL



健栄製薬株式会社

大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
 電話番号 06(6231)5626

きずの消毒・洗浄に

使用に際しては、説明書きをよく読んで下さい。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3)患部が広範囲の人。
- (4)深い傷やひどいやけどの人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効能効果〕 きずの消毒・洗浄

〔用法用量〕

そのままの液又は2～3倍に水でうすめた液を脱脂綿、ガーゼ等に浸して患部を洗ってください。

第3類医薬品

日本薬局方

オキシドール

つぶして廃棄
しやすい
減容ボトル



4 987286 307589



キャップ：PP
 ボトル：PE
 外装フィルム：PP

〜30℃