



24.9.25 再訂正版下提出
24.8.4再訂正版下提出-2
24.7.30訂正版下提出

500g

ヨクイニン末
日本薬局方
第3類医薬品

【お客様相談室】
株式会社榎本天海堂 品質保証課
電話番号 06(7711)0730
受付時間 10時~17時
(土、日、祝日を除く)

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

日本薬局方

ヨクイニン末

第3類医薬品

500g

△ 使用上の注意 (使用前に必ずお読みください)

■ 相触ること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
 - 胃腸の弱い人。
 - 発汗傾向の著しい人。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
消化器	胃部不快感

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】 いぼ、皮膚のあれ

【用法・用量】 次の1回量を1日3回、食前又は食間に服用してください。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2g(添付のサジ1杯分)	3 回
15歳未満	服用しないでください	

添付のサジはすり切り1杯約2gです。

＜用法・用量に関する注意＞

用法・用量を厳守してください。

【成分・分量】 1日量(6g)中
日本薬局方 ヨクイニン末 6g

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- 袋の中の脱酸素剤は、品質を保持(カビ・害虫防止)するためのものです。(脱酸素剤は、のまないでください。)

本剤のような植物を調整、刻み、粉末にして使用する薬剤は、天然物を用いておりますので、産地・天候・収穫時期等を一定にするのは非常に困難であるため、ロットによりまして色・味・においに多少違いが生じることがあります。

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

発売元
健栄製薬株式会社
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5626
製造販売元
株式会社 榎本天海堂
大阪市北区末広町3番21号



第3類医薬品

日本薬局方

ヨクイニン末

Powdered Coix Seed

500g

製造番号

使用期限

