

# 手ピカ<sup>®</sup> ジェル

消毒用アルコールジェル

水もタオルもいらないすり込み式  
細菌・ウイルスをすばやく消毒



知ってしまった  
新しい手の洗いかた

[www.tepika.net](http://www.tepika.net)

300mL

指定医薬部外品

## 販売名：手ピカ®ジェル

- 水もタオルもいらぬ速乾性すり込み式なので、手軽に手指消毒
  - ヒアルロン酸Na配合で、手指にやさしい
  - 広範囲の細菌・ウイルスをすばやく消毒
- 使用に際しては、説明書きをよく読んでください

- 【手指消毒法】 1. 適量を手のひらにとりませう。  
2. 手指全体に伸ばし、乾燥するまで、よくすり込みませう。

（最初に使用する時に）

キャップ①を固定し、ノズル②を矢印の方向に回すと、ポンプが上がりませう。液が出るまで散回押せませう。



【成分】 エタノール (C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>O) 76.9～81.4 vol%  
 添加物：ヒアルロン酸Na、グリセリン、トコフェロール酢酸エステル、カルボキシビニルポリマー、2,2',2"-ニトリロトリエタノール  
 注意 1. 次の人は使用しなませう●患部が広範囲の人 ●深い傷やひどいやけどの人 2. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談しなませう●医師の治療を受けている人 ●本人又は家族がアレルギー体質の人 ●薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人 3. 外用にのみ使用しなませう 4. 使用後は手を十分に乾燥させてください（乾燥不十分のまま火気に手を近づけると引火するおそれがあります） 5. 直射日光の当たらない涼しい所に保管しなませう 6. 小児の手の届かない所に保管しなませう 7. 火気に近づけなませう 8. 薬剤が床、家具、革製品、大理石や一部の宝石等に付着しないようにしなませう（変質又は変色のおそれがあります） 9. ノズルの先が詰まり、薬剤が勢いよく出ることがありますので、詰まりを取り除いて使用しなませう

### 健栄製薬株式会社

大阪市中央区伏見町2丁目5番8号  
 電話番号 06(6231)5822

**火気厳禁**（エタノール含有）  
**MADE IN JAPAN**

製造  
番号  
使用  
期限

右下部からはがして、説明書きをよく読んでください。



ボトル：PET  
 ポンプ：PP-PE  
 外装フィルム：PE



ラベル



指定医薬部外品

## 速乾性すり込み式

# 手ピカ® ジェル

アルコール類＊水溶性＊危険等級Ⅱ

**火気厳禁**

**！** 使用上の注意

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

次の人は使用しなませう

- (1) 患部が広範囲の人。
- (2) 深い傷やひどいやけどの人。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談しなませう  
 (1) 医師の治療を受けている人。  
 (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。  
 (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談しなませう

使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

【効能効果】 手指・皮膚の洗浄・消毒

【用法用量】 適量を手指にとり、塗布又は塗擦しなませう。

＜用法用量に関連する注意＞

- (1) 用法用量を厳守しなませう。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させなませう。
- (3) 目に入らないように注意しなませう。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってしなませう。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてしなませう。
- (4) 外用にのみ使用しなませう。
- (5) 血液や汚物等が付着している場合には、石けんでよく洗浄後、使用しなませう。
- (6) 使用後は手を十分に乾燥させなませう。（乾燥不十分のまま火気に手を近づけると引火するおそれがあります。）

【組成性状】

有効成分	エタノール (C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O) 76.9～81.4 vol%
添加物	ヒアルロン酸Na、グリセリン、トコフェロール酢酸エステル、カルボキシビニルポリマー、2,2',2"-ニトリロトリエタノール
性状	無色のわずかに混濁した粘性の液です。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管しなませう。
- (2) 小児の手の届かない所に保管しなませう。
- (3) 他の容器に入れ替えなませう。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) 火気に近づけなませう。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しなませう。
- (6) 薬剤が床、家具、革製品、大理石や一部の宝石等に付着しないようにしなませう。（変質又は変色のおそれがあります。）
- (7) ノズルの先が詰まり、薬剤が勢いよく出ることがありますので、詰まりを取り除いて使用しなませう。

＜貯法＞ 気密容器。火気を避けて室温保存。



### 健栄製薬株式会社

大阪市中央区伏見町2丁目5番8号  
 電話番号 06(6231)5822