

チピカ® ジェル

消毒用アルコールジェル

水もタオルもいらないすり込み式
細菌・ウイルスをすばやく消毒



ローズの
香り



知ってしまった
新しい手の洗いかた

www.tepika.net

300mL

指定医薬部外品

販売名：手ピカ®ジェル

●水もタオルもいらない速乾性すり込み式なので、手軽に手指消毒 ●ヒアルロン酸Na配合で、手指にやさしい

●広範囲の細菌・ウイルスをすばやく消毒

使用に際しては、説明書きをよく読んでください

【手指消毒法】 1. 適量を手のひらにとります。

2. 手指全体に伸ばし、乾燥するまで、よくすり込みます。

〈最初に使用する時に〉

キャップ①を固定し、ノズル②を矢印の方向に回すと、ポンプが上がります。液が出るまで微回押してください。

【成分】 エタノール (C₂H₆O) 76.9 ~ 81.4 vol%

添加物：ヒアルロン酸Na、グリセリン、トコフェロール酢酸エステル、カルボキシビニルポリマー、2,2',2"-ニトリロトリエタノール、赤色2号、フェニルエチルアルコール、香料

注意 1. 次の人は使用しないでください ●患部が広範囲の人 ●深い傷やひどいやけどの人 2. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください ●医師の治療を受けている人 ●本人又は家族がアレルギー体質の人 ●薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人 3. 外用にのみ使用してください 4. 使用後は手を十分に乾燥させてください (乾燥不十分のまま火気に手を近づけると引火するおそれがあります) 5. 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください 6. 小児の手の届かない所に保管してください 7. 火気に近づけないでください 8. 薬剤が床、家具、革製品、大理石や一部の宝石等に付着しないようにしてください (変質又は変色のおそれがあります) 9. ノズルの先が詰まり、薬剤が勢よく出ることがありますので、詰まりを取り除いて使用してください

健栄製薬株式会社

®登録商標

大阪市中央区伏見町2丁目5番8号

電話番号 06(6231)5822

火気厳禁 (エタノール含有)

MADE IN JAPAN

製造
番号

使用
期限

右下部からはがして、説明書きをよく読んでください。



ボトル：PET
ポンプ：PP/PE
外装フィルム：PE



ラベル

指定医薬部外品

速乾性すり込み式

手ピカ® ジェル

ローズの香り

アルコール類＊水溶性＊危険等級Ⅱ

火気厳禁



使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は使用しないでください

- (1) 患部が広範囲の人。
- (2) 深い傷やひどいやけどの人。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談してください

使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

【効能効果】 手指・皮膚の洗浄・消毒

【用法用量】 適量を手指にとり、塗布又は塗擦してください。

〈用法用量に関連する注意〉

- (1) 用法用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。
- (5) 血液や汚物等が付着している場合には、石けんでよく洗浄後、使用してください。
- (6) 使用後は手を十分に乾燥させてください。(乾燥不十分のまま火気に手を近づけると引火するおそれがあります。)

【組成性状】

有効成分	エタノール (C ₂ H ₆ O) 76.9 ~ 81.4 vol%
添 加 物	ヒアルロン酸Na、グリセリン、トコフェロール酢酸エステル、カルボキシビニルポリマー、2,2',2"-ニトリロトリエタノール、赤色2号、フェニルエチルアルコール、香料
性 状	赤色のわずかに混濁した粘性の液で、特異なにおいがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (6) 薬剤が床、家具、革製品、大理石や一部の宝石等に付着しないようにしてください。(変質又は変色のおそれがあります。)
- (7) ノズルの先が詰まり、薬剤が勢よく出ることがありますので、詰まりを取り除いて使用してください。

〈貯法〉 気密容器。火気を避けて室温保存。



健栄製薬株式会社

大阪市中央区伏見町2丁目5番8号

電話番号 06(6231)5822