

## さらっと伸びるローションタイプ

### ヘパリン類似物質配合 顔や手足の乾燥肌治療に

- 使いやすいワンタッチキャップ採用
- ステロイド無配合
- 無着色

### ヘパリン類似物質の作用



### おすすめの使い方

1日1～数回、洗顔後や入浴後などの清潔な肌に手で適量を塗ってください。



粉ふき  
ヒザ・カかとに!



衣類による  
乾燥・荒れに!



お風呂  
上りに!



赤ちゃん  
にも!

® 登録商標



健栄製薬株式会社  
大阪府中央区伏見町2丁目5番8号

健栄製薬(株)お問い合わせ先  
電話番号 (06) 6231-5822  
受付時間 9:00～17:00  
(土、日、祝日を除く)

製造番号  
使用期限

### 【効能効果】

手指の荒れ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかぎれ、乾皮症、小児の乾燥性皮膚、しもやけ(ただれを除く)、さす・やけどのあとの皮膚のしこり・つぶばり(顔面を除く)、打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛

### 【用法用量】

1日1～数回、適量を患部にすりこむか、又はガーゼ等にのびして貼ってください。

### 【用法用量に関連する注意】

- (1) 用法用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

### 【成分分量】

100g中 ヘパリン類似物質 0.3g  
含有 添加物：セトステアリルアルコール、白色ワセリン、グリセリン、2,2',2''-ニトロロトリエタノール、軽質流動パラフィン、スクワラン、ステアリン酸ポリオキシド 40、モノステアリン酸グリセリン、カルボキシビニルポリマー、パラオキシ安息香酸プロピル、パラオキシ安息香酸メチル

### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

副作用被害救済制度の問合せ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

健栄製薬

# 乾燥肌治療

# ヒルマイルド®

## ローション

ヘパリン類似物質  
**0.3%配合**  
60g



無添加

着色料  
不使用

ステロイド  
無配合

第2類医薬品

販売名：  
ヒルマイルド® ローション

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

### △ 使用上の注意

#### してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
1. 次の人は使用しないでください
    - (1) 出血性血液疾患(血友病、血小板減少症、紫斑病等)の人。
    - (2) わずかな出血でも重大な結果をきたすことが予想される人。(血液凝固抑制作用を有し出血を助長するおそれがあります。)
  2. 次の部位には使用しないでください
    - (1) 目や目の周囲、粘膜(口腔、鼻腔、膈等)。

#### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (3) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、紫斑

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

第2類医薬品