〔保管及び取扱い上の注意〕
(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に箱に入れて保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。(5)アルミ袋を開封した後は、品質保持の点からなるべく早く使用してください。(6)ＰＴＰのアルミ箔が破れたり、トローチが破損しないよう保管及び携帯に注意してください。

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

紙 箱

4 987286 200767

見 本

健栄製薬株式会社
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号

健栄製薬（株）お問い合わせ先
電話番号（06）6231-5822
受付時間 9:00～17:00
（土、日、祝日を除く）

のどの痛み・はれ

第３類医薬品

抗炎症 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

抗炎症 グリチルリチン酸二カリウム

殺 菌 セチルピリジニウム塩化物水和物

アズレンEトローチ

24錠

第３類医薬品

口腔内の殺菌・消毒にも

健栄製薬

のどの痛み・はれ

抗炎症 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

抗炎症 グリチルリチン酸二カリウム

殺 菌 セチルピリジニウム塩化物水和物

3つの有効成分

アズレンEトローチ

24錠

TROCHE
TROCHE

販売名：アズレンEトローチ 第３類医薬品

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

⚠使用上の注意

相談すること

1．次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2．使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症　状
皮　ふ	発疹・発赤、かゆみ

3．5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〔効能効果〕
のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ、口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去

製造番号
使用期限
[redacted]

〔用法用量〕
次の量を口中に含み、かまずにゆっくり溶かしてください。

年齢	１回量	１日使用回数
15歳以上	１錠	4～6回
5歳以上 15歳未満		2～3回
5歳未満	使用しないでください	

〈用法用量に関連する注意〉
(1)用法用量を厳守してください。
(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(3)かみ砕いたり、のみ込んだりしないでください。
(4)トローチの取り出し方　下図のようにトローチの入っているＰＴＰシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して使用してください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）

〈ＰＴＰシートの取り出し図〉



〔成分分量〕
6錠中　アズレンスルホン酸ナトリウム水和物4.8mg、グリチルリチン酸二カリウム15mg、セチルピリジニウム塩化物水和物６mg含有
添加物：ステアリン酸、ステアリン酸マグネシウム、*l*-メントール、ゼラチン、白糖、パラオキシ安息香酸メチル、エタノール、エチルバニリン、バニリン、プロピレングリコール、香料