




製造番号  
使用期限

6錠中 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物4.8mg、  
グリチルリチン酸二カルシウム15mg、セチルピリジニ  
ウム塩化物水和物6mg含有  
添加物：アズレンスルホン酸、アズレンスルホン酸ナトリウム、  
L-メントール、セチル、白糖、パラオキシ安息香  
酸メチル、エチルニリン、フェニル、香料  
アロピリコリウム、香料

【効能効果】  
のどの炎症による声かたれ、のどのあれ、のどの不快感、  
のどの痛み、のどのほれ、口腔内の殺菌・消毒、口臭の  
除去



【成分】  
6錠中 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物4.8mg、  
グリチルリチン酸二カルシウム15mg、セチルピリジニ  
ウム塩化物水和物6mg含有  
添加物：アズレンスルホン酸、アズレンスルホン酸ナトリウム、  
L-メントール、セチル、白糖、パラオキシ安息香  
酸メチル、エチルニリン、フェニル、香料  
アロピリコリウム、香料

3. 5日間使用しても症状がよくなりません場合は使用を  
中止し、この外箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又  
は登録販売者に相談してください  
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性  
があるため、直ちに使用を中止し、この外箱を持って  
医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販  
売者に相談してください  
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。  
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(4) トロリーの取り出し方、下図のようにトロリーの  
入っているPTPシートを指先で強く押し  
破って裏面のアルミ箔を破  
り、取り出して使用し  
、取り出し、誤ってそ  
とに使用させてください。  
(5) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督の  
下で使用してください。

副作用	発疹、かゆみ
禁忌	なし

△使用上の注意

相殺すること  
1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販  
売者に相談してください  
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。  
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(4) トロリーの取り出し方、下図のようにトロリーの  
入っているPTPシートを指先で強く押し  
破って裏面のアルミ箔を破  
り、取り出して使用し  
、取り出し、誤ってそ  
とに使用させてください。  
(5) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督の  
下で使用してください。

第3類医薬品

販売名：アズレントローチ

【用法用量】  
次の量を口中に含み、かますにゆくり溶かしてくだ  
さい。

年齢	1回量	1日使用回数
15歳以上	1錠	4〜6回
5歳以上 15歳未満	1錠	2〜3回
5歳未満		

使用しなさい

のどの痛み・はれ  
口腔内の殺菌・消毒に

アズレントローチ

24錠

第3類医薬品

抗炎症

アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

抗炎症

グリチルリチン酸二カルシウム

殺菌

セチルピリジニウム塩化物水和物

健栄製薬

のどの  
痛み・はれ

口腔内の殺菌・消毒に

アズレン  
トローチ

24錠



©meiji ad



3つの有効成分

アズレンスルホン酸  
ナトリウム水和物

抗炎症

グリチルリチン酸  
二カルシウム

抗炎症

セチルピリジニウム  
塩化物水和物

殺菌

第3類医薬品



副作用被害救済制度  
0120-149-931

健栄製薬(株) お問い合わせ先  
電話番号 (06) 6231-5822  
受付時間 9:00~17:00  
(土、日、祝日を除く)

健栄製薬株式会社  
大阪府中央区伏見町2丁目5番8号

【保管及び取扱い上の注意】  
(1) 直射日光の当たらない涼しい所に箱に入れて保管してください。  
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。(5) PTPのアルミ箔を開封した後、品質保持のため、  
開封した後は、なるべく早く使用してください。(6) PTPのアルミ箔が破れたら、トロ  
チーが破損しないよう、保管及び持ち運びに注意してください。